

D Verbreitet in den Centralalpen (Reiner & Hohenwart 1 p. 29; Rschf. 2 p. 152; Hornsch. 1 p. 322; Scheitz b. H. 1 p. 897. Hb. F.; Hinterh. & Hut. 1 p. 562; Gand.; Kell 1 p. 9, 13, 40; Weind. 1 p. 58, 65 etc.); Kreuzkofelgebiet (Keil 8 p. 161).

N Val di Sole (Fech. b. Ambr. 4 I. p. 486), Tonale, Pejo, Rabbi (Sard. Hb.); Gantkofel (Lbd. 14 p. 315), Brezner Jöchel (Pfaff).

B Sarntalergebirge (H. 1 p. 897; 20, Hb. F.; Mayrl ibid.; K. 86); Seiseralpe und Schlern (C. H. Schultz 1 p. 601; H. 1 p. 897, Hb. F.; Sendtn. b. Hfl. 35 p. 105; VL. Hb. F.; Kn. 1 p. 414; Osterm. 1 p. 156; Peyr. b. DT. 9 p. 79), Sellajoch (Crépin 2 p. 165), Rosengarten (Bornm.).

F Fassa (Fech. b. Ambr. 4 I. p. 486); Durontal (Osterm. 1 p. 155); Fleims: Lusiapaß (F. Hoffm. 1 p. 29), Sadole (Ambr. l. c.), Paneveggio (C. & A. Per. 4 p. 463); Primör: Rosetta (Bargagli 2 p. 155, 163).

G Matterott im Val di Genova (Sard. Hb.); Cengledino bei Tione (Boni b. H. 1 p. 897, Hb. F.).

T Cima di Vallarga im Fersinatale (Per. b. H. 1 p. 897), Montalone, Ciolera, Settelaghi, Cinquevalli (Ambr. 4 I. p. 486).

R Val di Ledro (Fech. b. Ambr. 4 I. p. 486).

3. (523.) **J. monanthos** Jacq. (1762), *J. trifidus* β *monanthos* Richter, *J. Schrankius* Moll. Naturhist. Briefe I. (1785) p. 83—84. II. p. 345, *J. Hostii* Tausch (1834), *J. trifidus* β *foliosus* Neilr. — Buchenau l. c. p. 182 Nr. 5^b; A. u. G. l. c. p. 427.

An ähnlichen Stellen wie *J. trifidus*.

V Rätikon: Schweizertor (Rehst. b. H. 1 p. 1494); Ganerajoch (Kemp 1 p. 123; Ohnes. b. Rich. 1 p. 85).

L Obermädlejoch (Sendtn. 3 p. 221, 286, 331, 881).

O Jamtal (Arn. 4 XXVII. p. 111); Schönjoch bei Obladis (Mik 3 p. 74); ? „Krähkogel bei Umhausen“ (Zucc. 1 p. 260). Der in den Pilzarbeiten Rehms (siehe Magn. 23 p. 334, 338, 341, 344, 377, 381, 398, 470, 477, 483) angeführte *J. monanthos* dürfte zu *J. trifidus* gehören.

I Hafelekar (Murr 44 p. 151), Lafatscherjoch (Murr); Lampsen (Grembl. Hb.); Sonnjoch (Eigner); Blaser (S.), Steinacherjoch (F. Saut.), Trunajoch (Glanz b. H. 20); Morgenspitze am Glungezer (Eschenl. Hb. F. u. b. H. 1 p. 897 als *J. trifidus*), Voldertal (*J. Zimm.* Hb. F.); Vennatal (Peyr. b. DT. 9 p. 79).

U Sonnwendjoch (Jeggle b. H. 20; K. 86); Naunspitze am Kaisergebirge (K. 86; Hofer 1 p. 36); Zillertal: Gerlosstein, Greiner (Braune 3 p. 212; 4 p. 403, 404), Waxegg (Moll 1 I. p. 83—84, 87; 2 p. 345).

K Kitzbühlerhorn auf Kalk (Ung. 8 p. 286; Trst. b. H. 1 p. 898, Hb. F.).

M Alpen bei Laas (Tpp. b. H. 1 p. 898, Hb. F.); Martelltal (Lorentz 3 p. 4); Zilalpe (Elssm. 2 p. 404; Pfaff).

E Wechseljoch am Brenner (Schm. 1 p. 43); Peitlerkofel (Bachl. 2 p. 17; Roth, Ausserd. b. H. 20), Gunggan (Kleb. 1 p. 67).

P Kasern in Ahrn (Fech. b. Ambr. 3 p. 387); an waldigen, felsigen Orten der Kalkalpen nicht selten (Hut. 6 p. 52), Spitzhörl (Schönach Hb.), Prags (H. 20), Toblacheralpe (Hell Hb. F.; b. H. 1 p. 897 als *J. trifidus*), Cristallotal (Artzt 2 p. 66; Bornm. 2 p. 43).