

[D Lienz (Gand. b. Schönach 2 p. 20), Leopoldsrue (F. Saut. 5 p. 354); das von F. Saut. so bestimmte Exemplar im Hb. F. ist jedoch nach der Bestimmung Buchenau's *J. glaucus*!]

[B Obervöls und an der Etsch bei Neumarkt (F. Saut. 5 p. 354); siehe oben.]

14. (534.) *J. obtusiflorus* Ehrh. — Buchenau l. c. p. 275 Nr. 54; A. u. G. l. c. p. 457.

In Gräben und Sümpfen, auf feuchten, etwas moorigen Wiesen.

V Im Rheintal und Illgebiet häufig bis in die unteren Alpen (Rich. 2 p. 77); Bodenseegebiet, Bregenz (Saut. b. H. 1 p. 898; K. 86; Horak); um Feldkirch (Kemp 1 p. 123; Hasler 1).

[O Die Angabe: Sölden (Wallis 1 p. 26) ist gewiß unrichtig.]

I Innsbruck: Gießen bei Mariahilf (Murr), ober dem Mühlauer Badhause [olim!] (Glanz Hb. F.; Hofm. Hb. Gymn.; Zimm. Hb. F.; Murr 103 p. 121); zwischen Thaur und Absam. Tritt in Nordtirol wie *Schoenus nigricans* nur relictartig an bevorzugten Stellen auf (Murr).

[K ? Bei Kössen (Schnabl b. Magn. 23 p. 50); Kitzbühel: die Angabe häufig an überschwemmten Orten in der Langau u. s. w. (Ung. 8 p. 286) gehört nach Trst. in Hb. F. zu *J. lampocarpus*.]

M Meran (Bamb. b. H. 1 p. 1494), Untermais (Entl. 1 IV. p. 12); Gargazon (Uechtr. b. Entl. l. c.).

N Unterer Nonsberg (Fech. b. Ambr. 4 I. p. 480).

B Bozen: bei Hörtenberg und Frangart (Pfaff), in Gräben gegen Sigmundskron, bei St. Jakob und gegen Leifers (H. 1 p. 898, Hb. F.; Fech. b. Ambr. 4 I. p. 480); Kaltern (Fech. l. c.), Kalterersee (H. 20); oberhalb Montan und bei Salurn (Fech. l. c.).

T Trient: Campo trentino, Gocciadoro (C. & A. Per. 4 p. 463), Casteller (Gelmi 10 p. 170), Vigolo gegen Valsorda (Fech. b. Ambr. 4 I. p. 480).

R Arco (Diettr.), Riva, Torbole (Lbd. b. H. 1 p. 898, 1494; Ambr. 4 I. p. 480); Rovereto häufig (G. Cob. 1 p. 69), Villa (Fech. b. Ambr. l. c.), unterstes Vallarsa (Crist. 1 p. 319).

15. (535.) *J. bulbosus* L. (1753), *J. supinus* Mönch (1777). — Buchenau l. c. p. 291 Nr. 65; A. u. G. l. c. p. 460.

In Gräben und Sümpfen.

Tirol (Host 2 III. [1805] p. 58).

V Gräben des Bodenseeriedes: var. *fluitans* (Lam.), *J. fluitans* Lam., *J. supinus* var. *fluitans* Fr. — Buchenau l. c. p. 293; A. u. G. l. c. p. 462 (Cust. Hb. nach Bruhin 3 p. 51); Dornbirn (Winder b. Zimmerm. 1 p. 10); Mittelberg (Bercht. 1 p. 20; b. Rich. 2 p. 77). — Die von Custer 1 p. 91 als *J. acutiflorus* ♂ beschriebene, „in arena mobili (Letten) ad Rhenum“ vorkommende Pflanze wird von Bruhin l. c. als „var. *repens* Schk.“ gleichfalls hiehergezogen, obwohl *J. bulbosus* bei Cust. 1 schon auf p. 90 erwähnt ist.

M Meran (Rainer b. Bertol. 2 IV. p. 205).

B Zwischen Kastelruth und Seis in einem Waldsumpfe oberhalb des Hofes Rungg 1200 m (H. Hb. F. u. 20). Im Zimmerlehener Weiher massenhaft und klafferlang flutend, andere Jahre wieder außer Wasser und unfruchtbar: var. *fluitans* (Lam.) (H. Hb. F., Bestimmung von Buchenau bestätigt; H. 20; Hut. b. Schönach 2 p. 20).