

18. (538.) **J. lampocarpus** Ehrh., J. lamprocarpus auct. pl.,
J. articulatus L. p. p., J. acutiflorus 3 Cust. in Neue Alpina I. (1821)
 p. 91, J. articulatus Bertol., Fl. Ital. IV. (1839) p. 197 (excl. var.). —
 Buchenau l. c. p. 376 Nr. 115; A. u. G. l. c. p. 476.

An ähnlichen Standorten wie vorige Art.

V Gemein bis in die Alpen.

L Lechufer bei Reutte (Kink b. H. 1 p. 899, Hb. F.); Elbigenalp
 (B. Moll Hb. F.).

O Fließ (Hellw.), Obladis (K. 86; Mik 3 p. 82); durch das ganze
 Ötztal bis oberhalb Vent 19—2000 m (K. 86).

I Gemein bis in die Alpenregion: Roßkogel 1930 m, Valmerizjoch
 19—2000 m (K. 86).

U Achental (K. 86; Hieronymus 1 p. 60); Rattenberg (Längst b.
 H. 20); Kufstein (K. 86), Thiersee (C. J. Mayer), Ebbs (Harrasser b.
 H. 1 p. 899).

K Kitzbühel (Ung. 8 p. 286 Nr. 970, 972; Trst. b. H. 1 p. 899; Peyr.
 b. DT. 9 p. 79).

M Meran (Eschenl. Hb. F.), Ziltal bei 1900 m, Trauttmansdorff (Lad.).

E Brennerbad (Peyr. b. DT. 13 p. 135); Sterzing (Hfl. b. H. 1 p. 999);
 Brixen (Bachl. 1 p. 79).

P und **D** häufig; noch: Teischnitz in Kals (Scheitz Hb. F.).

N San Zeno (VL Hb. F.).

B Gemein bis in die Voralpen: auf der Schön am Rittnerberg 1600 m
 (H. 20), Tschapith am Schlern, ca. 14—1500 m (Lbd. 8 p. 436).

F Fassa; Fleims (Fech. b. Bertol. 2 IV. p. 199); Primör, Canal San
 Bovo (Ambr. 4 I. p. 482; Paol. 1 p. 7, 9).

G Judicarien (Ambr. 4 I. p. 482), Tione (Boni Hb. F.).

T Trient (Lbd. b. H. 1 p. 899; VL Hb. F.; Sard. Hb.); Valsugana
 (Ambr. 4 I. p. 482).

R Monte Stivo bei Arco (Sard. Hb.), Gardasee (Clementi Hb. F. als
 J. articulatus); Rovereto (Crist. b. H. 1 p. 899, Hb. F.; Lbd. b. H. 1
 p. 899; G. Cob. 1 p. 69); Serrada (R. Cob. 8 p. 28); am tirolischen
 Baldo (Hfl. Hb. F.; Goir. 3 XVIII. p. 200). — A. u. G. l. c. p. 479.

Var. **fluitans** Cust. in Neue Alpina II. (1827) p. 399, Koch, Syn.
 ed. 1. (1837) p. 730, „J. lampocarpus 3 die fluthende Abar“ Mert. et
 Koch, Deutschl. Fl. II. (1826) p. 588, J. lampocarpus 2 heterophyllus
 („fluitans substerilis, foliis fasciculatis tenuissimis longissimis Fl. helv.
 6 p. 352“ [letzteres Citat ist falsch]), Gaud., Syn. (1836) p. 292,
 non J. lamprocarpus var. heterophyllus Duby, J. heterophyllus
 Dufour (1825). — A. u. G. l. c. p. 479.

V In mit Wasser gefüllten Gräben des Bodenseeriedes bei Höchst
 (Cust. 2 p. 309) und danach: „inter Rheineck et Fussach am Boden-
 seeried“ (Gaud. 2 p. 293), Mehrerau (Bruhin 3 p. 48).

B Ritten (H. 1 p. 899); Zimmerlehenener Weiher bei Völs (VL Hb. F.).

T Lago Serraja in Pinè (VL Hb. Hb. F.).

Var. „**vivipara**“, J. lamprocarpus var. *prolifer* Parlat., bezieht
 sich meist auf die häufigen durch Livia juncorum Latr. deformierte
 Exemplare.