

— **J. affinis** Gaud. — Siehe A. u. G. l. c. p. 461, 477.

Die Angabe: (**K**) „auf der Alpenfläche am Fusse des grossen Röthensteins in 5000“ (F. Saut. b. Saut. 34 p. 179) bezieht sich nach dem Befunde im Hb. F. Saut. auf die auf der salzburgischen Seite gelegene Stangalpe bei Mählbach.

19. (539.) **J. triglumis** L. — Buchenau l. c. p. 388 Nr. 119; A. u. G. l. c. p. 484.

An Sumpfstellen und quelligen Orten der Alpen.

**V** Kleines Walsertal (Bercht. 1 p. 20; b. Rich. 2 p. 77); Schlappolt (Sendtn. 3 p. 881); Hochkrummbach (S. b. Rich. l. c.); Schadonapass (S. Hb. F.); Tilsuna (Bornm. 1 p. 42).

**L** „Bei Obermädele“ (Sendtn. 3 p. 881); Bieberwier (Hellw. nach Murr).  
**O** Fimbertal (Rehst. b. H. 1 p. 1494; Peyr. b. DT. 9 p. 79); Nauderertal (Tpp. b. H. 1 p. 897); Oetztal: Rofen 2000 m (Tpp. 1; K. 86), Thalleitspitze (K. Hb.), Ramoljoch 2500 m (K. 86), Gurgl (K. 2 p. 3706; 9 p. 269).

**I** Um Zirl [wo?] (Andr. Saut. 2 Nr. 186); Lavatschatal mehrfach (Gremhl. Hb.; S.); Stubai: Kalkkögel (V. Ebner in Hb. K.); Alpein (K. 86), Pfandleralpe (K. b. S. 4 p. 381); Waldrast, bis 1450 m herab (Glanz, Hepp. b. H. 1 p. 1494; Peyr. b. DT. 9 p. 79; K. Hb., b. S. 4 p. 381; Murr); verbreitet auf den Gebirgen des vorderen Gschnitztales und des Obernbergtales (Glanz b. H. 20; F. Saut.; K. 86, Hb.; Murr; S.), dann vom Patscherkofel bis zum Brenner (Zimm., Pichler Hb. F.; Glanz l. c.; K. 86; Murr; S. 2 p. 84).

**U** Auf den Alpen gegen die bayerische Grenze, z. B. Wildalpen, Rittelsberg, Drausnitz (Längst b. H. 1 p. 1494); Schwarzensteingrund (K. Hb.; Hirsch 1 p. 117).

**K** Auf Moorböden der Schiefergebirge von 1300 bis 1950 m (Ung. 8 p. 285), Jufen (Saut. 7 p. 477), Kleiner Rettenstein (Schm. b. H. 1 p. 897), Geisstein (Saut. 7 p. 467).

**M** Matschertal (Eschenl. b. H. 1 p. 897); Stilfserjoch bis 2750 m (K. Hb.; Peyr. b. DT. 9 p. 79); Laaseralpen (Tpp. b. H. 1 p. 897); Martelltal (Lorenz 3 p. 4); Timmljoch gegen Passeier (Zucc. 1 p. 262); Zitalpe (Elssm. 2 p. 404); Ulten (Fcch. b. Ambr. 3 p. 387; 4 l. p. 476).

**E** Zragerboden am Brenner (K. 86), um Sterzing (Schm. 1 p. 43), Hochsägescharte zwischen Pfitsch und Pfunders 2800 m (Hirsch 1 p. 117); Brixen (Schm. b. H. 1 p. 1494), Schalders (Bachl. 1 p. 79), Plose (Bray 1 p. 144), Gunggan (Kleb. 1 p. 67).

**P** Corvara (Gredler b. H. 20), Pordoi joch (S.); Toblacheralpe (Hell b. H. 1 p. 897); Höhlenstein-Ampezzanertal (Hut. 6 p. 52), Plätzwiesen 1700 m (Arzt 2 p. 62), Misurina (Hackel 1 p. 667).

**D** Verbreitet im Virgen- und Kalsertale (Rschf. 2 p. 152; Hornsch. 1 p. 322; Scheitz b. H. 1 p. 897; Hinterh. & Hut. 1 p. 562; Kell 1 p. 8; Ausserd. b. K. 78b II. p. 148); Schobergruppe (Weinl. 1 p. 62, 64); Helm 16–2300 m (H. 20; Bornm.), Toblinger Riedl (Buchner), Kreuzberg (Schönach); Kreuzkofelgruppe (Keil 8 p. 161; Pichler Hb. F.).

**N** Tonalepass, Pejo (Sard. Hb.); Rücken des Gantkofel (Lbd. 14 p. 315).

**B** Villandereralpe (H. 1 p. 897), Rittneralpe (H. 20); Aufstieg zu den Geißlerspitzen (Zallinger b. H. 20), Seiseralpe und Schlern (Eschenl. Hb. F.; C. H. Schulz 1 p. 601; H. 1 p. 897; 20; Lbd. 8 p. 436, 444;