

B ?Seiseralpe (Möller 1 p. 398 und danach? Artzt 4 p. 94); Bozen: häufig am Sigmundskroner Schloßberge (Fcch. 5 p. 40; b. Rehb. 7 IX. p. 15; H. 1 p. 901; Tpp. ibid., Hb. F.; K. Hb.; F. Saut. b. K. 78^a Nr. 1049, 78^b III. p. 138); Montiggler- und Leuchtenburgerwald (Lbd. b. H. 1 p. 1495).

F Val Cadino (Gelmi 10 p. 170), Paneveggio; San Martino (A. Schulz 1 II. p. 171; Gelmi 1. c.).

T Trient: „Base di Povo, Gocciadoro“ (C. & A. Per. 4 p. 463), was Gelmi 3 p. 35 auf L. pilosa bezieht, aber durch Exemplare Val de Lièvre's im Hb. F. und Murr 60 p. 102 eine Bestätigung erfährt, Ravina (Murr 1. c.); Borgo gegen Torcegno, bei Castagnè (Ambr. 4 I. p. 492; b. C. & A. Per. 4 p. 463; b. H. 1 p. 901, Hb. F.).

R Rovereto (Poll. 3 I. p. 465; Hepp. 1), Vallunga daselbst (K. Hb.); am Fuße des Monte Baldo (C. & A. Per. 4 p. 463).

2. (542.) **L.** *luzulina* (Vill.) nob., *Juncus luzulinus* Vill. (1787), *J. flavescens* Host (1805). *Luzula flavescens* Gaud. — Buchenau l. c. p. 80 Nr. 3; A. u. G. 1. c. p. 494.

In Wäldern, an lichten und schattigen Stellen, auf Lärchwiesen.

V Pfänder (Saut. b. H. 1 p. 901); Fraxernalpe (Aichinger 2 p. 290), zwischen Vorder- und Hinter-Aelple (Rich. 1 p. 85); Tschagguns, Gargellen (Bornm. b. Rich. 3 p. 132), Zeinisjoch (Ebner & Glanz Hb. F.).

O Fimberalpe (Peyr. b. DT. 9 p. 79); Zameralpe (Hellw.); Obladis (Mik 3 p. 74); Venterthal (Tpp. 1).

I Leutasch (Roth & Glanz b. H. 20; Hellw.), Seefeld (K. Hb.; Zimm. Hb. F.), Inzingerberg (Sendtn. b. Hfl. 35 p. 105); Lisenertal 1565 m (Kot. Hb.); verbreitet um Innsbruck und Hall beiderseits des Tales von 600 m: Völs, Volderwald (Handel 2 p. 28) bis 1890 m: Patscherkofel (Kot. Hb.); Schwaz (Reis. b. Grembl. Hb.); häufig durch Stubai bis oberhalb Ranalt 1740 m (K. b. S. 4 p. 381); Trins: am Blaser ca. 1800 m und gegen Valzam 1450 m (F. Saut.; K. 86); Pfons 1200 m (Kot. Hb.); Duxerjoch (F. Saut.); Vennatal (Peyr. b. DT. 9 p. 79).

U Am Sonnwendjoch oberhalb Münster (Längst b. H. 1 p. 1495); Längensee bei Kufstein (K. Hb.).

K Vom Tale bis 1600 m (Saut. 7 p. 478, 480; Ung. 8 p. 285; Trst. b. H. 1 p. 901), Blaufeld (Saut. 4 p. 36); Kitzbüchlerhorn (Saut. 7 p. 464); Jochberg (Roth & Glanz b. H. 20).

M Schlinig (Tpp. b. H. 1 p. 901); Stilfserjoch (Stocker b. H. 1 p. 1495); Laaseralpen; Jochhof bei Naturns (Tpp. 1. c.); Spronsertal (Bamb. Hb. F.).

E Roßkopf bei Sterzing (Fisch. 2 (1883) p. 46, Hb.); Burgumeralpe in Pfitsch (K. 86); Brixen: ober Tils gegen den Radlsee (Bachl. 1 p. 79), im Trametschtal, auf Alpen gegen Afers, in Gunggan auf Kalkboden von 1600 m an (Kleb. 1 p. 67), am Wege von Afers nach Villnöß (Heimerl 2 p. 456).

P Mühlwald (Gand. b. Schönach 2 p. 20); Gsies (Hut. b. H. 20); Prags: Altprags, Stolla-Alpe (H. 20); Maistatt (H. 1 p. 1495); Toblachersee (Bornm.), Ampezzo (Hut. 6 p. 52).

D Winnebach (Ausserd. b. H. 20); Virgen (Gand.), Bergeralpe (Kell 1 p. 5); Windischmatrei gegen das Thörl (Hut. Hb. F.; Hinterh. & Hut.