

Var. *fuliginosa* Aschers. (1864). — Buchenau l. c. p. 95; A. u. G. l. c. p. 504.

D Hopfgarten in Deferegggen (Scheitz Hb. F.; b. H. 1 p. 903 als β rubella).

N Mendel (H. Hb. F.).

B Ritten, Klobenstein, Rittneralpe (H. Hb. F., Nr. 1 p. 903 als β rubella); nach H. 20: „ β rubella“ am Rittnerhorn bis 2020 m; Seiseralpe (VL. Hb. F.).

F Lusiapaß bei Paneveggio (F. Hoffm. 1 p. 29).

Var. *parviflora* Döll. — Buchenau l. c. p. 95; A. u. G. l. c. p. 504.

E Steinwend in Schalders (Hauskn. 9 p. 84).

Var. *flaccida* Buchenau in Hb. F.

Spirre die Hülle erreichend oder überragend.

B Klobenstein am Ritten (H. Hb. F.; siehe 1 p. 903).

Var. *glabrescens* C. H. Schultz in Flora XVI. (1833) p. 602.

B Seiseralpe (C. H. Schultz 1 p. 602).

7. (547.) **L. nivea** (L.) DC., *Juncus niveus* L. — Buchenau l. c. p. 100 Nr. 15; A. u. G. l. c. p. 506.

In Wäldern und Gebüsch: unter Fichten und Buchen, unter Legföhren und Rhododendren der Alpen- und Voralpenregion, sowie in den gemischten Laubgehölzen und Kastanienhainen der Niederungen Südtirols; an feuchtschattigen Felsen, in Schluchten.

V Häufig um Feldkirch (Cust. 1 p. 148; Hasler 1; Aichinger 2 p. 291; Schönach; Zimmerm. 1 p. 10; Rich. 1 p. 86) und in Liechtenstein (Rich. 2 p. 77), Eschenerberg (Cust. 3 u. b. H. 1 p. 903).

O Finstermünz (Tpp. 1; Schramm 1 p. 19; 2 p. 88); Schrankogel bei Längenfeld (Harg. 1 p. 439).

I Vom Walchensee (K. 86) herein im oberen Isargebiete und bis oberhalb Zirl verbreitet; Leutascher Klammberg (Zucc. 1 p. 258), Purberg (Hellw.), Scharnitz (Saut. 11 p. 63; K. 86; S.), Hinterautal (Hf. b. H. 1 p. 903; Grembl. etc.), Gleirschtal (S.), um Seefeld (Hf. 3 p. 4; b. H. 1 p. 903; K. 86; S. etc.); Zirlerberg bis oberhalb Fragenstein 800 m herab (Hf. Hb. F.; K. 86; S.; Murr 58 p. 196; vergl. K. 15 p. 781); Gschnitztal: um Trins auf Kalk bei 13—1900 m (Glanz b. H. 20; F. Saut., F. Kern. b. K. 78^a Nr. 1870, 78^b V. p. 87; S.); Oberberg (Glanz Hb. F.); Hirzer im Wattentale (Köpf).

U Brandenberger Mahd (Längst b. H. 1 p. 1495).

M Godria bei Laas (Tpp. 1); Meran (Bamb. b. H. 1 p. 1495; Milde 38 p. 2), Algund, Brandiser Wasserleitung (Entl. 1 IV. p. 12); Ulten (Schm. Hb. F.), Gampenloch (K. 83).

E Wechselalpe am Brenner (Peyr. b. DT. 9 p. 80); Schalders (Hofm. b. H. 1 p. 903; Bachl. 1 p. 80), in der Voralpenregion der Plose (Kleb. 1 p. 67).

P Verbreitet in den Kalkalpen südlich der Rienz (schon Wulf. 4 p. 445).

D Bergeralpe in Virgen auf Kalkboden (Kell 1 p. 8, 38); Schobergruppe (Weinl. 1 p. 68); Bad Innichen (Diettr.), Sexten (Stapf b. H. 1