

Var. α *Allionii* E. Meyer. — Buchenau l. c. p. 112; A. u. G. l. c. p. 512.

Die gewöhnliche Form.

Forma *pallens* Ilse. — A. u. G. l. c. p. 513.

D Dorferalpe in Kals (Scheitz Hb. F.).

Forma *altissima* Buchenau in Hb. F.

B Rittnerhorn: Hornwasserl (H. Hb. F.).

Var. β *Candollei* E. Meyer. — Buchenau l. c. p. 112; A. u. G. l. c. p. 513.

M Laasertal (Tpp. Hb. F.).

— *L. parviflora* (Ehrh.) Desv., *Juncus parviflorus* Ehrh. — Buchenau l. c. p. 108 Nr. 21; A. u. G. l. c. p. 497.

„Auf Alpen Vorarlbergs“ (Saut. 11 p. 34) und wohl danach: „Tyrolis“ (Maly 1 p. 47). — Eine arktische Pflanze, welche den Alpenländern fehlt (siehe H. 1 p. 1200; Neilr. 2 p. 43), und welche von Sauter nur in irriger Auffassung von *L. spadicosa* angeführt wurde.

— *L. nutans* (Vill.) Daval-Jouve, *Juncus nutans* Vill. (1785), *J. pediformis* Chaix (1786), *Luzula pediformis* Lam. et DC. — Buchenau l. c. p. 119 Nr. 26; A. u. G. l. c. p. 514.

K Kitzbühel: Jufen, Geisstein (Saut. 3 p. 130; 7 p. 477, 467, 479), ist wohl *L. spicata*, oder vielleicht, da p. 467 neben dieser genannt, *L. compacta*.

D Auf der Lazer- und Lavanteralpe (Rschf. 2 p. 152): „auf der Kerschbaumeralpe fand ihn Freyherr von Seenus“ (Rschf. 3 Nr. 309), überall neben *L. spicata*: siehe H. 1 p. 1201.

R „Videtur varietas omnibus partibus major, capsulisque acutiusculis. Varietas haec [von *L. spicata*], si bene memini, mihi occurrit in Baldo monte“ (Poll. 3 l. p. 468), welche Angabe jedoch nach Neilr. 2 p. 43 zu *L. spicata* gehört.

11. (551.) *L. spicata* (L.) DC., *Juncus spicatus* L., *L. spicata* β *campestris* E. Meyer. — Buchenau l. c. p. 127 Nr. 30; A. u. G. l. c. p. 515.

Auf trockenen Grasmatten, besonders Nardus-Wiesen der Alpen, auf grasigen Rücken und Kämmen; vorzüglich über Silikatgesteinen.

V Freschen (Cust. 1 p. 90; Saut. b. H. 1 p. 905); Ifenplateau (Sendtn. 3 p. 884); oberhalb Stuben (Kn. 1 p. 441), Flexensattel 1700 m (C. J. Mayer).

L Obermädlepaß und Muttekopf (Sendtn. 3 p. 330, 331, 884).

O Unter dem Weißseejoch am Arlberg (Rich.); Fisseralpe (Mik 3 p. 74), Pizlat (Tpp. 1); verbreitet im Bereiche des Oetztals, untere Grenze oberhalb Winterstall bei 1800 m, höchster Punkt am Birkkogel bei Kühetai 2830 m (K. 86).

I Solsteinkette (Andr. Saut. 2 Nr. 182; b. C. H. Schultz 3 p. 123; K. 86; Kot. Hb.; Murr 44 p. 151); verbreitet in den Centralalpen über Schiefer und Kalk von 1460 m: Lisensertal bis 2688 m: Glungezer (Kot. Hb.).