

**U** Unnutz, auf tiefem Humus über Dachsteinkalk 1860 m, Rofanspitze (K. 86; siehe 9 p. 237); Widdersbergerhorn in Alpbach (Längst b. H. 1 p. 1496); Schwarzensteingrund (K. 55 p. 147).

**K** Auf Schiefer über 1900 m (Ung. 8 p. 284; Trst. b. H. 1 p. 905); Steinberg im Brixental (Steinberger 1), Jufen (Saut. 7 p. 477 als *L. pediformis*; 4 p. 36 als *L. spicata*), Geisstein (Saut. 7 p. 467); siehe oben *L. nutans*.

**M** Griänkopf (Tpp. 1); Stilsferjoch (H. Hb. F.; Peyr. b. DT. 9 p. 80), Jeanwand bei Laas (Tpp. Hb. F.); Zilalpe (Elssm. 1 p. 404, Hb. F.), Sprons—Lazins (Lbd. 10 p. 662), Muttspitze, Vellauer Alpe (Entl. 1 IV. p. 12).

**E** Pfärsch (Anonym 6; Noë 2 p. 64), Brenner (Fech. b. Ambr. 4 I. p. 503), am Rücken zwischen Brenner und Pfärsch (F. Saut.; K. 86; Peyr. b. DT. 9 p. 80); Spiluck (Heimerl 2 p. 457), Schalders (Bachl. 1 p. 80), Plose (Heimerl 1. c.; Kleb. 1 p. 67).

**P** Gsies (Hut. 6 p. 53); Toblacheralpe (Hell b. H. 1 p. 905, Hb. F.).  
**D** Verbreitet in den Centralalpen (schon Wulf. 4 p. 446 u. Hoppe 3 [1799] p. 126); südlich der Drau: Helm (Bornm.); Kreuzkofelgruppe (Keil 8 p. 161).

**N** Tonale (VL. Hb. F.); Val Cercena in Rabbi (Tpp. 1).

**B** Rittnerhorn von 1900 m aufwärts (Elssm. 2 p. 407; H. 1 p. 905); Franz Schlüter-Hütte in Villnöß (Ostern. 2 p. 72), Schlern und Seiseralpe (H. 1. c.; Lbd. 8 p. 444, 453 etc.), Sellajoch (VL. Hb. F.; Crépin 2 p. 165); Zanggen 2400 m (Bornm.).

**F** Fassa (Fech. b. Ambr. 4 I. p. 503); Durontal (Ostern. 1 p. 155), Col Rodella (Briquet 6 p. 484); Fleims; Reiterjoch gegen Predazzo (Seelos b. H. 20), Castellazzo (Fech. b. Bertol. 2 IV. p. 220; b. Ambr. 1. c.); Primör; Pala di San Martino (Lbd. b. H. 1 p. 1496), Do Piz (Schunck 1 p. 339).

**G** Matterott-Gletscher in Val Genova (Sard. Hb.); Cima del Frate (Lbd. 6 p. 150).

**T** Monte Gazza (C. & A. Per. 4 p. 464), Bondone (C. & A. Per. ibid.; Lbd. b. H. 1 p. 905; Gelmi 1 p. 70); Montalone (Ambr. 4 I. p. 503).

**R** Alpen um Rovereto (Crist. b. H. 1 p. 905, Hb. F.); häufig am tirolischen Monte Baldo (Sternb. 5 p. 49; Hb. b. H. 1 p. 905; K. 86; Goir. 3 XVIII. p. 183), dann auf den Bergen im Hintergrunde des Vallarsa und des Ronchitales (Goir. 1. c.).

12. (552.) *L. compacta* (E. Meyer), *L. spicata*  $\beta$  *compacta* E. Meyer (1823), *L. glomerata* Mielichb. (1839), *L. spicata*  $\beta$  *conglomerata* Koch (1844). — Buchenau 1. c. p. 129; A. u. G. 1. c. p. 517.

In der höheren Alpenregion.

**O** Fimberjoch (Peyr. b. DT. 9 p. 80).

**I** Vennatal (Peyr. b. DT. 9 p. 80).

**K** Am Geisstein bei 2270 m (Trst. b. H. 1 p. 905, Hb. F.), von Buchenan als *L. spicata* erklärt; vergl. auch oben *L. nutans*.

**M** Stilsferjoch und Ortlergebiet (Peyr. b. DT. 9 p. 80); Pfossental in Schnals 3100 m (K. 86).

**E** Brenner: Wolfendorn, Gidergitz 2500 m mit *L. spicata* (F. Saut.), Schlüsseljoch (Peyr. b. DT. 9 p. 80), Hühnerspiel über 2300 m, zuerst mit *L. spicata*, dann gegen den Gipfel zu allein (F. Saut.; Murr 71 p. 18; 115 p. 71 u. in litt.).