

P Ampezzo (Seelos b. H. 1 p. 876; Hut. 6 p. 51). Tre Croci (Habl), gegen Falzarego; Col di Lana in Buchenstein (Hut. Hb. F.).

D Kreuzberg in Sexten (Hut. 6 p. 51 etc.).

N Val Meledrio bei Dimaro (Eschenl. 1); Proveis (Hfl. b. H. 1 p. 876), nördlich der Alpe Lavace und bei Proveis gegen den Hochwart 1650—2000 m (Handel 4 p. 360), Unser Frau im Walde, St. Felix (Pfaff); Rücken des Gantkofel (Lbd. 14 p. 315), Mendel (H. 1 p. 876).

B Villnöß (DT.); Schlern (H. 1 p. 876; Sendtn. b. Hfl. 35 p. 105). Seiseralpe gegen den Schlern (Griesselich 1 p. 249); Sellajoch (Pfaff); Eggental: Lärch (Psenner b. H. 1 p. 1491), Welschnoven gegen Weißenstein (F. Saut. 5 p. 354); Hornalpe bei Grill (Pfaff).

F Fassa (Fech. b. Bertol. 2 IV. p. 133); Fedaja, Clarvana (Schunck 1 p. 335, 338), Monte di Pozza, oberhalb Vigo (Fech. b. Ambr. 4 I. p. 543); Fleims: Altrei, Aufstieg von Cavalese nach Lavazzè (Pfaff), Cucal (Scopoli 2 p. 49), häufig um Predazzo und im Travignolotale (Fech. 1. c.; Seelos b. H. 20; Schunck 1 p. 338; Anonym 113 p. 141; Eichenf. 3 p. 34), daselbst bis 1050 m herabgehend (S.); Primör: San Martino (Bargagli 2 p. 101, 163; F. Hoffm. 1 p. 30), Canal San Bovo (Lbd. b. H. 1 p. 1491; Fech. b. Ambr. 4 I. p. 543).

G Campiglio (Eschenl. b. H. 1 p. 876); Tione (Boni b. H. 1 p. 876); Stenico: Spina und Algone (Loss Hb. F.), Monte San Martino (S.); Val Lorina (Lbd. 6 p. 148).

T Bondone (Hfl. b. H. 1 p. 876, VL. Hb. F.; Gelmi 1 p. 69); Vigolo Vattaro (Murr); Vetricolo (Pfaff), Gebirge bei Torcegno, Telve, Val Tesino (Ambr. 4 I. p. 543; b. H. 1 p. 876), Val di Sella (Pfaff).

R Val di Ledro 10—1800 m (Porta b. Giacomelli 2 p. 167; b. K. 78^a Nr. 1481, 78^b IV. p. 86, Hb. F.; Foletto 1 p. 22); Bergwiesen bei Rovereto (Crist. b. H. 1 p. 876, Hb. F.), Serrada (R. Cob. 8 p. 27), Colsanto (C. & A. Per. 4 p. 461), Vallarsa bis 950 m herab (K. Hb.); an tirolischen Anteile des Monte Baldo (Lbd. 6 p. 132; K. 50 p. 220, Hb. etc.).

Die nördliche Vegetationslinie verläuft demnach von Unterengadin: Samnaun (Killias 2 p. 182) her durch Tirol über folgende Punkte: Matschertal—Gadriatal—Platzerjochl—Schlern—Villnöß—Col di Lana—Ampezzo—Kreuzberg.

111. *Anthericum* L., Zaunlilie.

1. (564.) *A. liliago* L. — A. u. G. l. c. p. 47.

Auf kräuterreichen Bergwiesen, auf grasigen Plätzen zwischen Buschwerk und Felspartien; von den Niederungen des unteren Etschtales bis in die Voralpenregion.

V Rötthlis; Triesenerberg gegen Sücca (Nachbaur b. Rich. 5 p. 341); Sarüja-Alpe (Ender b. Rich. 1 p. 137); Airlberg; Montavon (Rehst. b. H. 1 p. 1491).

L Lechtal: Elbigenalp, Bschlaps (Pechlaner; B. Moll), zwischen Elmen und Stanzach (K. Müll. 5 p. 350).

O Sehr verbreitet im ganzen Bereiche des Venetberges, z. B. um Fließ (Hellw. b. Murr 26 p. 20), daselbst bei Egg, Greltern, massenhaft gegen den Piller bis über 1300 m; dann jenseits des Inn bei Urgen (Hellw.), in zahlloser Menge auf allen Wiesen bei Ladis, Obladis und Fiss (Wiedemayr 1 p. 11; Mik 3 p. 75; S.); Trams bei Landeck (S.), Gungglgrün bei Imst (Lutt. 1; b. H. 1 p. 875).