

10 p. 166); Valsugana: Puisse bei Borgo, Monte Broccone, Val Gallina bei Bienno (Ambr. 4 l. p. 556; b. H. 1 p. 1492), Val di Sella (Pfaff). **R** Ballino (Pfaff); Val di Ledro (Gelmi 10 p. 166); ? Vallarsa zwischen Polsa und Spino (Crist. 1 p. 341); am tirolischen Baldo bis 1600 m (Poll. 1 p. 114; 3 l. p. 451; b. Bertol. 2 IV. p. 89; Goir. 3 XVI. p. 128); Campobrun, Monte Posta, Revolto 994 m, Podesteria 1660 m (Goir. l. c. p. 129, 128).

Var. **Brentae** Evers, *G. Brentae* (*G. lutea* Schult. var. *Brentae*), Evers in Verh. zool. bot. Ges. Wien XLVI. (1896) p. 88.

T Malga Mezzodi, unterhalb der Bocca di Brenta an schmelzendem Schnee (Evers 8 p. 89).

114. *Lloydia* Salisb., Lloydie, Faltenlilie.

1. (574.) *L. serotina* (L.) Salisb., *Anthericum serotinum* L. — A. u. G. l. c. p. 94.

Auf schattigen, schneewasserbefeuchteten Grasabhängen, in humosen Felsritzen, Azaleenpolstern, auf moosigen Felsenterrassen der Hochalpen, meist über kieselhaltigen Gesteinen.

V Zerstreut auf den höheren Alpen (Rich. 2 p. 76); Rothwand bei Dalaas (Horak); Joch zwischen Samina- und Gamperdonatal, Salerul (Kemp 1 p. 122; Schönach; Horak). Lünensee, Schweizertor (Rehst. b. H. 1 p. 1491; F. J. Winter 1 p. 424), Oefenpaß (Hasler 1), Tilisuna-Alpe (Cust. b. H. 1 p. 874), Gargellental (Hasler 1).

L Gimpele bei Steeg (Frol. b. Kögl 1 p. 356), am Pimig bei Kaisers (Murr 4 p. 124).

O Samnaun auf den Gräten (Käser b. Killias 2 p. 181), Tösens (Andr. Saut. b. H. 1 p. 874, Hb. F.), Schmalzkopf bei Nauders (Freyberger b. Saut. 28 p. 621); Oetztal: Brunnenkogel (Pfaff), beginnt im Ventertale oberhalb Winterstall bei 1680 m, an nördlich exponierten Gehängen der rechten Talseite; häufig an der Zwerchwand ober Rofen 2260—2500 m (K. 86, Hb.).

I Hocheder, Grieskogel zwischen 1600 und 2270 m (Andr. Saut. 1 p. 408; 2 Nr. 160; 4 p. 228; 5 p. 756), Roßkogel über 2300 m (Saut. b. H. 1 p. 874; K. b. J. Kern. 3 p. 409, Hb.; 86); Lisens Ende Mai, also höchstens bei 1700 m (J. Zimm. b. H. 20), Längental 20—2050 m (Perkt. b. H. 1 p. 874; K. l. c. u. 86), am Lisenser Ferner (Hf. b. H. 1 p. 874), Kamplspitze bei Praxmar 2600 m (Kot. Hb.); Widdersberg (K. 86); auf der Kuppe des Patscherkofel (Perkt. 7 p. 142).

M Sehr verbreitet: Geisenplatte und Griänkopf im Rayentale (Tpp. 1), Glurnserköpfl (Zimm. 1 p. 1054, Hb. F.); Sulden (Funck b. Koch 10 p. 186; Giovanelli b. H. 1 p. 874; Zimm. Hb. F.), Laasertal (Tpp. b. H. 1 p. 876); Schnals (Götsch 1 p. 58); Zilalpen (Elssm. 2 p. 403, Hb. F.; Bamb. Hb. F.); Passeier (Per. b. H. 1 p. 874), Timmljoch, Eisjochl [nicht Hochjoch!] (Lbd. b. H. 1 p. 874); Ifinger (Vieh. b. H. 1 p. 1491); Ulten: Falkomai-Alpe (Giovanelli, Eschenl. b. H. 1 p. 874, Hb. F.), Lachalpe (Pfaff), Kirchberg gegen Colem (Ambr. 3 p. 386; 4 X. p. 435); siehe auch **N**.

P Col di Lana in Buchenstein (Seelos b. H. 1 p. 874; Hut. 6 p. 51).

D Bergerkofel in Virgen 2600 m (Kell f. p. 9); Glocknergruppe (Hinterh. & Hut. 1 p. 561), Steinerlpe 2200 m, Kals (Gand., Steiner in Hb. K.), Rottenkogel (Mayr 1 p. 177), Dorferalpe in Kals (Scheitz