

p. 131); Vals bis 1700 m (F. Saut.; S. 2 p. 37, 50); Vennatal (S. 2 p. 52).

**U** Voldöppkäpfli (Pechlaner), Kropfsberg (Waldm. Hb. F.; siehe H. 1 p. 883); Sparchen bei Kufstein 550 m (K. 86), Hinterkaiser (Harg. 1 p. 437 als A. angulosum; Gschwentner 1 p. 86; Eigner), Grenzhorn (Murr 13 p. 48); Hinterdux (Längst b. H. 20), Zemmgrund, mehrfach (Gebh., Hfl. b. Stotter & Hfl. 1 p. 131, Hb. F.; K. Hb.).

**K** Auf sonnigen Berggehängen der Kalkalpen (Ung. 8 p. 290), am Kaiser bei St. Johann (Trst. b. H. 1 p. 883).

**M** Marienberg (Treinfels Hb. K.), Tartscherbühel (Hofm. b. Stotter & Hfl. 1 p. 131); Sulden (Gebh. ibid.); Laas (Tpp. Hb. F.); verbreitet um Meran (Hfl., Krafft b. Stotter u. Hfl. l. c.; Tpp. Hb. F.; Bamb. b. H. 1 p. 1493; Lbd. 10 p. 658; Entl. 1 IV. p. 11).

**E** Brenner: Daxtal (Pechlaner), Hühnerspiel bis 2260 m (K. 86), Gossensaß (Sendtn. b. Hfl. 35 p. 105); Sterzing (Stotter & Hfl. 1 p. 131; Schm. 1 p. 43); Pfitsch (Kammerlander in Hb. K.); Brixen (Hofm. b. Stotter & Hfl. l. c.; Bachl. 1 p. 78; S.), weißblühend bei Seeburg (Hellw. b. Murr 47 p. 81).

**P** Bruneck (F. Nauss b. Stotter & Hfl. 1 p. 131, Hb. F.); Höhlenstein-Ampezzanertal (Hut. 6 p. 51); Buchenstein (Hfl. 3 p. 4).

**D** Virgen (Gand.), Bergeralpe (Kell 1 p. 5); Windischmatrei (Schönach in Hb. K.); Glocknergruppe (Hinterh. & Hut. 1 p. 562); Michlbacher- und Marenwalderalpe (Reiner & Hohenwart 1 p. 29 als A. angulosum; Wolf. 4 p. 419; Rschf. 2 p. 137), Lienz (Scheitz b. H. 2 p. 883; Hut. H. b. H. 20); Kreuzkofelgebiet (Keil 8 p. 162).

**N** Fondo (Lbd., Grabm. b. H. 1 p. 883, 1493), Revò (Ambr. 3 p. 387), Cles: auf feuchtem Kies an der Novella (Loss. Hb. F.); Spormaggiore (Ambr. l. c.).

**B** Um Klausen mehrfach (Heimerl 2 p. 457); Ritten (Hofm. b. Stotter & Hfl. 1 p. 131; H. 1 p. 883); Kuntersweg an Felswänden (Vulpius 4 p. 367 als A. angulosum), Waidbrück (Kot. Hb.); Kastelruth (Hfl. b. H. 1 p. 883), Schlern (Lbd. 8 p. 437; b. H. 1 p. 883); häufig in der Umgebung von Bozen (Elssm. H. b. Stotter & Hfl. 1 p. 131, 130; H. 1 p. 883; Lbd. 14 p. 308; H. 20 etc.), mit schneeweissen Blüten bei Ceslar (Grabm. b. H. 20); Eppan (Stotter & Hfl. 1 p. 130; b. H. 1 p. 883); Tramin (Kot. Hb.); Salurn (H. ibid.).

**F** Castello bei Cavalese (Ambr. 4 I. p. 566; S.).

**G** Stenico beim Castell (Loss. Hb. F.).

**T** Monte Gazza (Merlo Hb. F.; b. H. 1 p. 883 als A. acutangulum); nicht selten um Trient (Fech. b. Bertol. 2 IV. p. 52; C. & A. Per. 4 p. 462; Ambr. 4 I. p. 566; VL. Hb. F.); Borgo gegen Scurelle (Ambr. b. H. 1 p. 883, Hb. F.).

**R** Um Areco und Riva bis 100 m herab (K. 86; Wettst.): sehr häufig um Rovereto (Meneghini b. Bertol. 2 IV. p. 52; Crist. 1 p. 339 etc., Hb. F.; Ambr. 3 p. 387; 4 I. p. 566; G. Cob. 1 p. 68), Mori (Kot. Hb.).

8. (582.) **A. ochroleucum** Waldst. et Kit. (1805), ?A. ericetorum Thore (1803). A. suaveolens Duby et auct. tirol. ital., non Jacq., A. suaveolens b. pallidiflorum Rota, Prosp. fl. prov. Bergamo (1853) p. 85, 102. — A. u. G. l. c. p. 127.

An trockenen, steinigen, waldigen sowie an sumpfigen Stellen.

**G** Zwischen Bagolino und Lodrone, wohl außerhalb der Grenze (Fech. b. Rchb. 7 X. p. 25; b. Ambr. 3 p. 387; 4 I. p. 567), am Monte