

**T** Verbreitet auf Kalk; bei Trient bis gegen Vela (C. & A. Per. 3 p. 128) und Povo [dieses 400 m] herab (C. & A. Per. 4 p. 461).

**R** Verbreitet bis ins unterste Vallarsa: zwischen Polsa und Spino [ca. 400 m] (Crist. 1 p. 340; b. H. 1 p. 873) herab; weißblühend am Monte Baldo (Gelmi b. Murr 65 p. 116).

— **L. carniolicum** Bernh. — A. u. G. l. c. p. 181.

**F** Rodella in Fassa [nicht in Primör!] (Schunck 1 p. 339), beruht sicher auf irriger Bestimmung.

#### 117. *Fritillaria* L., Schachblume.

— **F. meleagris** L. — A. u. G. l. c. p. 187.

Tirol (Maly 1 p. 51).

**K** Kitzbühel (Ung. in Hb. Tpp.: H. 1 p. 872), doch sicher nur aus einem Garten stammend.

**M** „Angeblich bei Nals und Lana?“ (H. 1 p. 872).

1. (595.) **F. Burnatii** Planchon in Bull. soc. bot. France XX. (1873) p. 115, *F. Delphinensis* c. *Burnatii* Richter, *F. tubiformis* Gren. et Godr. C. *Burnatii* Aschers. et Gr., *F. Delphinensis* auct. pl. non Gren. et Godr., *F. tombeanensis* Boiss. ined., *F. Meleagris* auct. pl. tirol. — A. u. G. l. c. p. 189.

**G** Am Monte Bondol bei Condino 18—2000 m (Porta b. Dörf. 1<sup>a</sup> Nr. 3254, 1<sup>b</sup> I. p. 92, Hb. F.); Val Vestino (Fech. b. Ambr. 3 [1853] p. 386). „In valle de Comun Judicariensium, inter frutices humiles rarasque loco declivi Orientem et Meridiem spectante, potius arido“ (Fech. b. Ambr. 4 I. p. 831). „Il Dott. Facchini la rinvenne nel 1851 nella valle di Vestino in un luogo chiamato la Val de Comun e le Mandrie, verso il termine degli alberi“ (Ambr. 4 I. p. 530), ebendasselbst (Porta b. Gelmi 10 p. 164), auf Alpentriften im Val Vestino 16—2100 m (Porta b. Sard. 3 p. 77; b. K. 78<sup>a</sup> Nr. 1045, 78<sup>b</sup> III. p. 137, Hb. F.), Gambolet bei Bondone 2000 m (Cimarolli), Monte Tombéa 1600 m (Porta in Hb. K.).

2. (596.) **F. tenella** Marsch.-Bieberst. (1808), *F. montana* Hoppe (1832). — A. u. G. l. c. p. 190.

Die Beschreibung nach der lebenden Pflanze von Trient, welche Hausmann in Mscr. gibt, möge hier eingeschaltet werden: Stengel von der Basis bis ungefähr zur Hälfte hinauf nackt, oben sparsam beblättert, einblütig; Blätter zerstreut, die zunächst unter der Blüte zu 2—3, alle graugrün, die unteren flach, lang, linealisch-lanzettlich, zugespitzt, die oberen linealisch, rinnig, oft gedreht; Blüte etwas überhängend, würfelförmig bemalt, gelblich mit rotbraunen Würfeln. Auch befinden sich an üppigen Exemplaren gegenständige untere Blätter, wie Reichenbach anführt und abbildet.

**T** Trient: in Gebüsch und auf Aeckern an der West-, Nordwest- und Nordseite des Doss Trento, beziehungsweise unter demselben, i. J. 1855 von Viehweider entdeckt (H. 9 p. 197; 10 p. 376), dann noch von vielen anderen gesammelt (Wördle, Porta, Morandell b. H. 20; Gelmi b. Goir. 3 XVI. p. 127; Per. b. Gelmi 3 p. 35; VL. Hb. F.; Pernter in Hb. Schönach). Auch zweiblütig (VL. Hb. F.; Gelmi 10 p. 164) und selten eine breitblättrige Form (Murr 88 p. 53).