

p. 290; Schönach; Rich. l. c.); Feldkirch: bei Maria Grün und Fellen-gatter (Schönach 2 p. 20).

[I In Baumgärten bei Buch und Freundberg nächst Schwaz (Glanz, Barth, Ebner b. H. 20). Wohl nur kultiviert!]

[U Zillertal: in Gärten gezogen, „blawe Träubelar“ (Moll 2 II. p. 337), dürfte *M. racemosum* sein.]

E Brixen: bei Balbitt am Rande des Waldes (Bachl. 1 p. 78), im Kapuzinergarten (Bachl. 2 p. 16).

D Lienz: bei der Amlacher Wiehre von Josef Ortner gefunden (Rschf. 2 p. 150), auf Wiesen gegen Amlach (Hut. b. H. 20), daselbst neben dem Fußwege von der Draubrücke nach Amlach in Masse (H., Pichler b. H. 20). Auch in Gärten kultiviert (Ausserd. b. H. 20).

G „Sommità della selva di Campiglio presso i casolari di ricovero“ (C. & A. Per. 4 p. 462); Wiesen bei Prada nächst Tione (Boni b. H. 1 p. 889, Hb. F.); Lomasone di Stenico (Loss Hb. F.); Val Daone und Dorf Daone (Porta b. H. 20; b. Gelmi 10 p. 167).

T Bei Molveno (Pfaff).

R Auf Bergwiesen und Alpentriften im Val di Ledro: Lanciada oberhalb der Baumgrenze, Falconetti, südlich vom See (Fech. 5 p. 37; b. Ambr. 3 p. 387; 4 I. p. 581). Val di Ledro bei 700—2000 m (Porta b. K. 78^a Nr. 681, 78^b II. p. 142 etc.); am Monte Baldo (Poll. 3 I. p. 447; Rainer b. Bertol. 2 IV. p. 165); daselbst ai Pianetti (Fech. 5 p. 37) und am Artitone (Goir. 3 XVI. p. 145). Vom Monte Baldo an Clusius weißblühend mitgeteilt: „Lactei prior species [Hyacinthus botryodes purpureus III.] olim nobis communicata à C. V. Alphonso Pantio, memini & in Baldo monte erutam à studiosis quibusdam ex Italia reducibus Viennam adferri“ (Clusius 2 p. 182), von Goiran (siehe l. c.) jedoch so nicht beobachtet. — Der Angabe: in der Ebene bei Riva (Braung. 14 p. 278) scheint nach Braung. in litt. ein Irrtum zu Grunde zu liegen.

4. (614.) *M. benacense* Murr ad inter., *M. botryoides* subsp. *benacense* Murr in Allg. bot. Zeitschr. XI. (1905) p. 150.

R Nur ein Stock zwischen Nago und Torbole mit *M. racemosum* (Murr l. c.).

5. (615.) *M. comosum* (L.) Mill., *Hyacinthus comosus* L. — A. u. G. l. c. p. 275.

An sonnigen Hügeln und Rainen, in Gebüsch, Weingärten, auf Aeckern, Grasplätzen.

M Bei Staben 553 m (Vulpus 4 p. 67); häufig um Meran (Tpp. Hb. F.; Isser, Bamb. h. H. 1 p. 889, 1493; Milde 13 p. 430, 444; Entl. 1 IV. p. 11; Pfaff).

?D Auf Aeckern im Bereiche der Schober- (Weinl. 1 p. 56) und Kreuzkofelgruppe (Keil 8 p. 154); nach Mitteilung von Dr. F. Sauter jedoch gewiß nicht um Lienz vorkommend.

N Häufig im unteren Nonsberg, bis Don 950 m beobachtet (S.).

B Molten (Pfaff); gemein um Bozen und in Ueberetsch (Eschenl. 1; Elssm. 1 p. 506; H. 1 p. 889 u. 20; Peyr. b. DT. 9 p. 78 etc.); Tramin (Sabr. b. Magn. 23 p. 42), Margreid (H. 1 p. 889; S.).

F Cavalese: an Rainen gegen Varena 1020 m (S.).

G Tione (Boni b. H. 1 p. 889, Hb. F.); Stenico (Loss Hb. F.).