

des Chegul 470—630 m (VL. Hb. F.), ebenda gegen Celva (Gelmi l. c. u. in Hb. Sard.), Monte Maranza 900 m (Murr 113 p. 2).

R Ueber Aldeno gegen Val di Ceſ (Murr 60 p. 154); Monte Baldo (Barbieri b. Bertol. 2 IV. p. 148), wohl außerhalb der Grenze.

— **A. acutifolius** L. — A. u. G. l. c. p. 297.

M An der Straße zwischen Laas und Schlanders (Harg. 1 p. 441): dürfte *A. officinalis* gewesen sein.

T „In sepibus praesertim collinis agri Tridentini, Brixianensis, Veronensis etc. frequentissimus est“ (Poll. 3 I. p. 457). „Il Facchini ad onta delle sue assidue perustrazioni non trovò giammai questa specie nel Trentino, nè io conosco Botanico, che abbia finora potuto verificare l'esistenza dell' *A. acutifolius* nella località dal Pollini riportata“ (Ambr. 3 I. p. 586).

124. *Ruscus* L., Mäusedorn.

1. (618.) **R. aculeatus** L. — A. u. G. l. c. p. 300.

An warmen, trockenem, seltener feuchten steinigen Orten unter Laubgebüsch, oft eine ganze Vegetationsschicht bildend.

Tirol (Laichard. 1 II. [1791] p. 569).

M Am linksseitigen Etschtale bis 1 km oberhalb Gargazon herauf (Lad. 1 p. 9; b. Murr 81 p. 123 u. in litt.).

B Bozen: an allen südlichen und westlichen Abhängen von Terlan bis Gries (Elssm. 1 p. 508; Hfl. 3 p. 4; H. 1 p. 870; Lbd. 10 p. 658; Milde 22 p. 52; Vulpius 4 p. 68; Dürer 1 p. 153; Peyr. b. DT. 9 p. 78 etc.), Hörtenberg (Pfaff), unterstes Eisaktal (K. Müll. 3 p. 342), Kalvarienberg (Dürer 1 p. 153), Haslach (Schönach), Ueberetsch; Sigmundskron (Eschenl. 1; Zucc. 1 p. 264; H. 1 p. 870 etc.); Kaltern (Hfl. 4^b p. XXI etc.), Montiggl (Hfl. b. H. 1 p. 870), Kalterersee (K. 86), Mitterberg (Sabr. 2 p. 144); Margreid (H. 1 p. 870), Geierberg bei Salurn (Bolle 2 p. 9). Obere Grenze hier bei 400—450 m.

G Val Daone [mindestens 700 m] (Gelmi 10 p. 168).

T Häufig um den Toblino-See (C. & A. Per. 4 p. 461); Trient (Eschenl., Per. b. H. 1 p. 870, Hb. F.); Piazzina (Gelmi 10 p. 168). Von Murr um Trient niemals beobachtet, also hier jedenfalls sehr selten.

R Tenno, ca. 400 m (Boni b. H. 1 p. 870, Hb. F.), Arco (K. 86, Diettr.), Riva (Spieker 1 p. 379; Pichler Hb. F.; Arn. 4 IX. p. 309; K. 86; Foletto 1 p. 22); Rovereto: zwischen Polsa und Spino di Vallarsa (Crist. 1 p. 342), ziemlich häufig bei Castello di Lizzana (G. Cob. 1 p. 67); Ala (K. 86; Höllrigl in Hb. F.).

Var. *Barrelieri* Goir. in Nuova Giorn. bot. ital. XVII. (1885) p. 10. *R. aculeatus* var. β *latifolia* Hsm. Mscr.

In allen Teilen stärker und starrer, Cladodien weniger zahlreich, 2—3 mal größer und breiter (Hsm.).

B Um Bozen (H. 20).

— **R. hypoglossum** L. — A. u. G. l. c. p. 301.

B Bozen (Spieker 1 p. 380), was sicher auf Verwechslung mit (dem dort nicht erwähnten) *R. aculeatus* beruht.

R Nach Pona, Seguler, Moreni und Pollini (siehe Poll. 3 III. p. 196) im Val fredda am italienischen Baldo (wo er jedoch nach Goir. 3 XVII. p. 11 nicht gefunden werden konnte) und auf Grund dessen in Maly 1 p. 58 und anderen compilatorischen Werken für Tirol angegeben.