

Valsugana auf Kalk: Val di Sella, Civeron, Vanesi bei Borgo, Tezze (Ambr. 4 I. p. 615).

R Val di Ledro: Südseite des Monte Gavardina 1920 m (S.); Gebirge um Rovereto (Ambr. 4 I. p. 615); Serrada (R. Cob. 6 p. 75; 8 p. 27); am tirolischen Monte Baldo (Poll. 1 p. 112; Goir. 3 XVII. p. 16; Pfaff).

128. *Convallaria* L., Maiglöckchen.

1. (624.) *C. majalis* L. — A. u. G. l. c. p. 313.

An lichten Waldplätzen, Waldsäumen, in Gebüsch, Laubgehölzen, Buchenwäldern, auf Bergwiesen, besonders an steinigen Lehnen, eingeschalteten Gebüsch und Felsgruppen, in Tälchen und Schluchten; vorwiegend über kalkhaltigen Bodenarten; hier oft geschlossene Formation bildend.

V Verbreitet bis in die unteren Alpen; doch liegen aus dem Schiefergebiete Montavons keine Notizen vor.

L Häufig im Lechtale (Friedle b. H. 20; Zimm.; B. Moll; S.); Fernpaß (S.).

O Fließ (Hellw.); Imst (Lutt. b. H. 1 p. 869); Oetz, Umhausen; Telfs (S.).

I Sehr häufig im Bereiche der nördlichen Kalkalpen und im Inntale; hier auch zwischen Ranggen und Volders auf der rechten Seite bis Mittelgebirgshöhe; im Silltale bis zur Schupfen und gegen Patsch, dann im Lärchwalde hinter Mieders (S.) und an mehreren Orten im äußeren Gschnitztale oberhalb Steinach und um Trins; hier auf Glimmerschiefer [ehemals!] sehr schön entwickelt (K. 86; S.). Höchste Standorte: Gleirschtal 15—1550 m (Enzenberg 1), ober der Hungerburg 1580 m (K. 86). Eine kleine Form (var. minor Rchb., Fl. exc. p. 100 [1830]) wird von Zucc. 1 p. 258 von Leutasch erwähnt.

U Häufig im Kalkgebirge: Achental, Steinberg, Brandenburg, um Rattenberg und Kufstein (Berndorffer 1 p. 126; Waldm. b. H. 1 p. 869; Pichler b. H. 20; K. 86; S.); Zillertal (K. 86), Hinterdux (Alpenburg $\frac{1}{2}$ p. 33 als *Lilium convallium*), Waxegger Bergmähder [bei 17—1800 m (Moll 1 I. p. 84)].

K Nur im nördlichen Teile dieses Gebietes auf Kalk (Ung. 8 p. 291; Trst. b. H. 1 p. 869).

M Reschen am Fuße des Pizlat, ca. 1600 m (Tpp. 1; b. H. 1 p. 869); Trafoital bis oberhalb Drei Brunnen 1675 m (Tpp. 1; K. 86); Meran: Mutspitze, Vellauer alpe, Marlingerberg (Entl. 1 III. p. 167), Quadrathöfe, Eggerhof, Lebenberger alpe (Zivny).

E Brenner, selten (F. Saut.); Sterzing, am Ausgange des Pfitschtales (Schm. 1 p. 43; Fischn.); Steinwend in Schalders; Brixen, am westlichen Bergabhänge (Bachl. 1 p. 77).

P Rittjoch zwischen St. Vigil und Wengen (Haller 1 p. 39 als *Lilium convallium*); Welsberg (Hell b. H. 1 p. 869); Ampezzo (Hut. 6 p. 51).

D Windischmatri (Hinterh. & Hut. 1 p. 561), Rottenkogel (Mayr 1 p. 177); Kreuzberg in Sexten (Hut. 6 p. 51); Kreuzkofelgruppe (Keil 8 p. 163), am Fuße des Raichkofel (Rschf. 2 p. 144 u. b. H. 1 p. 869), von Kapaun abwärts bis Pirchach, sowohl an der Sonnen- als Schattenseite (Ausserd. b. H. 20).

N Mendel (H. 20; S.); Castell Brughier (S.).