B Ritten, nicht selten bis in die Voralpenregion, z. B. am Roßwagen, 1700 m (H. 1 p. 869 u. 20); Bozen: Jenesien gegen Rafenstein, Judenfriedhof, Kampenn (Pfaff), im Haslacher Walde und am Fuße des Kühbacherberges (H. 1 p. 869), hier auch i. J. 1856 eine Spielart mit Perigonen, welche inwendig am Grunde 6 purpurne Makeln zeigten (H. 20); bei Kollern (F. Saut. 6 p. 12); Karneid und Steinegg (Gundlach b. H. 1 p. 869); Eppan (Stocker b. H. 1 p. 1491; Pfaff); Truden (S.); Salurn (H. 20; Pfaff).

F Fassa (Rainer b. Bertol. 2 IV. p. 140); Fleims (Ambr. 4 I. p. 619), Cavalese, Bellamonte bei Predazzo, Porphyr 800—1300 m (S.).

G Campiglio 1500 m (Eschenl. 1; S.); Tione bei Stelle (Boni b. H. 1 p. 869); Stenico (Loss Hb. F.), überall auf Kalk.

T Häufig in der Mittelgebirgs- und Voralpenregion um Trient (C. & A. Per. 4 p. 461; VL. Hb. F.; Gelmi 1 p. 71; Sard. Hb.; Pfaff); Levico (Broso), Val Centa (Pfaff), Sorasalmo, Civerone, Val di Sella bei Borgo, Tezze (Ambr. 4 I. p. 618, 619).

R Scanuppia (C. & A. Per. 4 p. 461), Serrada (Crist. 1 p. 358; R. Cob. 8 p. 27); Terragnolo 435 m (Kot. Hb.); Zugna (Pfaff), Colsanto (Crist. 1 p. 333), Vall' Artilone am Monte Baldo (Poll. 1 p. 112).

129. **Paris** L., Einbeere.

1. (625.) **P. quadrifolius** L., P. quadrifolia auct. — A. u. G. l. c. p. 317.

In Wäldern, Gebüschen und Auen, an feuchten, moosigen Felsen, in schattigen Gräben und Schluchten, von den Talebenen des nördlichen Gebietes und den Mittelgebirgen Südtirols bis in die voralpine Region:

O Paznaun: Trittmähder bei Galtür, ca. 1600 m (Lenz 2 p. 333), Bodenalpe im Fimbertale, mindestens 1800 m (Peyr. b. DT. 9 p. 78).

I Blaser 1750 m (S.).

M Trafoi: ober den Drei Brunnen [diese 1600 m] (Tpp. 1).

E Burgumeralpe in Pfitsch 1600 m (K. 86).

P Pragsersee 1740 m (H. 20).

F San Martino: Pala-Alpe, Aufstieg zur Rosetta [mindestens 16—1700 m] (Bargagli 2 p. 163).

G Oberstes Val Gavardina 1850 m (S.).

In den Niederungen Südtirols selten:

M Meran: Marlingerwaal [ca. 400 m] (Zivny).

B Bozen: in der Rodlerau (Fischn. Hb.), an einer Stelle in der Kaiserau (H. 1 p. 1491).

R Rovereto: bei Castelcorno und in einer Schlucht nächst dem Castel Lizzana (G. Cob. 1 p. 67); im untersten Vallarsa unterhalb allo Spino (Crist. 1 p. 319).

Nicht angegeben: im Montavon; im hinteren Oetztale; in den Centralalpen östlich von Pfitsch außer: Taufers (Isser b. H. 1 p. 867) und Schobergruppe (Weinl. 1 p. 68) und im Chiesegebiete.

Oft mit 3 und 5, selten mit 6 und 7 Blättern, unter der normalen Form.