

- stiege im Stallentale (Lergetporer 1 p. 33; 4 p. 31); südlich des Inn: Roßkogel (K. 86); Blaser (K. Hb.; S. Hb. F.), Trinser Padaster 2050 m (K. Hb.; 86), Sondestal (K. 86; S.); Oberrnberger Seen (J. Zimm. Hb. F.); Volders (Stocker b. H. 20), Voldertal (Grembl. Hb.); Rosenjoch (Bilek); Vennatal (S. 2 p. 52).
- U** Achental: Schafspitze (Pichler b. H. 20) und Zunderspitze im Unteraubachtale (K. 86); Sonnwendjoch, an der Brantweinhütte (Waldm. b. H. 1 p. 834), Hinteres Sonnwendjoch (C. J. Mayer); Ebbs (Harrasser b. H. 1 p. 834); Zillertal: in der Zemm (Schrank 1 p. 28).
- K** Geisstein (Saut. 7 p. 467; Ung. 8 p. 288; Trst. b. H. 1 p. 834).
- M** Schnals (Götsch 1 p. 58); Meran: Vellauer Alpe, Egger, Mutspitze (Entl. 1 III. p. 166); Gampenpaß gegen das Platzerjochl (Pfaff).
- E** Wieser-Bergwiese in Schalders (Bachl. 1 p. 75), zwischen Raas und Fiums, ca. 850 m (Bachl. 2 p. 16), auf Bergwiesen ober Klerant, am Freien Bühel, bei Burgstall 10–1400 m (Kleb. 1 p. 68).
- P** Enneberg: Rittwiesen (Zschacke 1 p. 23), Incisajoch (Buchner); Ampezzaner Alpen (Hut. 6 p. 49).
- D** Virgen bis ca. 2100 m (Gand.; Kell 1 p. 12); Hopfgarten in Defreggen (Scheitz b. H. 1 p. 834); Glocknergebiet (Hinterh. & Hut. 1 p. 561; Mayr 1 p. 177); Kreuzberg in Sexten (Hut. 6 p. 49); Alpen um Lienz (Hohenwart 1 [1785] p. 398; Reiner & Hohenwart 1 p. 30; Rschf. 2 p. 155; b. H. 1 p. 834; Keil 8 p. 159; Weinl. 1 p. 64); Hochstall 2000 m (Keller 1 p. 367).
- N** Val di Sole, selten (Bresadola); Mendelwiesen (Stocker b. H. 20).
- B** Auf allen Gebirgen der weiteren Umgebung von Bozen, bis ca. 2100 m: Salten, Ritten, Villnöß, Grödnerjoch, Schlern und Seiser-alpe, Tiers, Rosengarten, Eggental, Weißenstein, Mendelkette (Eschenl. b. H. 1 p. 834; Elssm. 2 p. 707; H. 1 p. 834; 20; Lbd. 8 p. 437; F. Saut. 6 p. 12; Peyr. b. DT. 9 p. 76; Zschacke 2 p. 124; Pfaff; Sabr. 2 p. 145; Bornm. etc.); an der Mendel bis Perdonig, ca. 700 m herab (Lbd. 14 p. 310). Mit weißen, rotgetüpfelten Blüten von Seelos bei Kübbach gefunden (H. 20); ein außergewöhnlich tiefer Standort, ca. 400 m!
- F** Fassa: Udai (Hinterh. b. H. 1 p. 834; Osterm. 1 p. 157), Fedaja 2000 m (Osterm. 1 p. 158); Fleims (Ambr. 4 I. p. 686), Lusiapaß gegen Moëna (F. Hoffm. 1 p. 28), Predazzo bei 1050 m, Bellamonte (S.), Monte Viësen, Castellazzo (Schunck 1 p. 338, 339); Primör (Lbd. b. H. 1 p. 1487); Monte Tatoga (Ambr. I. c.).
- G** Judicarien (C. & A. Per. 4 p. 458); Val d'Algone bei Stenico (Loss Hb. F.), Monte San Martino (S.); Val Lorina bei Storo (Lbd. 6 p. 139).
- T** Andalo, Molveno (Pfaff); Bondonè, Chegul, Marzola (C. & A. Per. 4 p. 458 etc.), Maranza (Köhler); Pinè (Bresadola); Valsugana (Ambr. 4 I. p. 686).
- R** Val di Ledro (Ambr. 4 I. p. 686; Porta Hb. F.); Serrada (Crist. 1 p. 359; R. Cob. 8 p. 26; 9 p. 41); Vallarsa bis 950 m herab, selten (K. 86), Zugna (Pfaff); am tirolischen Baldo (Poll. 1 p. 108; 3 III. p. 6; K. 86; Goir. 3 XV. p. 30).

18. (667.) **O. Spitzelli** Saut. in Koch, Syn. ed. 1 (1837) p. 686. Fch. in Zeitschr. Ferdinandum Innsbruck 3. Folge V. (1855) p. 113, dessen nach der lebenden, südtirolischen Pflanze entworfene Diagnose (siehe unten) von der Kochs, nach der Originalpflanze aus Saalfelden