

angefertigten, etwas abweicht! Vergl. indessen Fritsch in Verh. zool. bot. Ges. Wien XLI. (1891) p. 22. — Koch l. c. p. 595; Schulze l. c. Nr. 12.

Auf steinigem Berg- und Alpenwiesen, Heideboden.

?N Tonalepaß (Rota 2 p. 81; Rod. & Ven. 2 p. 3) — ob in Tirol?

G Nördlich des Val Bondone bei Storo und im obersten Val Vestino (Fech. i. J. 1847 b. Ambr. 3 p. 381; 4 I. p. 688), Val Bragon bei Ampola auf hebuschten steinigem Triften 950—1420 m mit dunkelviolett-grünlichen Blüten; dann gegen Tremals zu (Lbd. b. Hb. 22 p. 185; Lbd. 6 p. 139, Hb. F.), Val Vestino 13—1800 m (Porta b. K. 78^a Nr. 677, 78^b II. p. 141), Monte Tombèa (Porta b. H. 20; b. Dörf. 1^a Nr. 3198, 1^b I. p. 71), am Alpo (Porta b. Hut. 3 p. 140). Was den Standort „Gavardina“ bei Ambr. 3 p. 381, beziehungsweise „sopra la Malga inferiore della Gavardina in Giudicarie“ bei Ambr. 4 I. p. 688 und „Alpe Gavardina“ bei Bertol. 2 IX. p. 526 betrifft, an welchem Facchini die Pflanze gleichzeitig wie am unten folgenden Standorte im Val di Ledro aufgefunden haben soll, so scheint hier eine Verwechslung mit Letzterem vorzuliegen. Facchini sagt selbst (5 p. 113; b. Ambr. 4 I. p. 834): „In flore recente (nec compressione in herbario violato), observatur perigonium in galeam connivens. foliolis obtusiusculis, exterioribus e fusco lividis. Labellii lobi laterales minores obliqui medius emarginatus (1842). I Gui in valle di Ledro. — „Calyx galeato-connivens, foliolis 3 exterioribus fuscis. Labellum 3-lobum, lobis lateralibus lato-oblongis, medio majore emarginato. Labellum pallide roseum obscurius punctatum. In valle Gaverdina di Giudicarie“ (haec scripsi in loco, ergo Kochii definitio non exacta)“. Hienach war hier mit dem Ausdrucke „valle Gaverdina“ offenbar der erstgenannte, südlich des Monte Gavardina gelegene Standort und nicht das nordwestlich davon verlaufende Tal gemeint gewesen.

?T Toblino-See (Schaubach 1^b IV. p. 373).

R Auf der Alpe „I Gui“ im Val di Ledro, am Südabhange des Monte Gavardina von Facchini i. J. 1842 entdeckt und an Koch gesendet (Koch 21 ed. 1. p. 488; 11^a ed. 2. [1844] p. 791; Fech. b. Ambr. 3 p. 381; 4 I. p. 688; Fech. 5 p. 113). Monte Gavardina und Trat im Val di Ledro 10—2000 m (Porta Hb. F.; b. Schulze 1 Nr. 12; b. Dörf. 1^a Nr. 3198, 1^b I. p. 71). Val di Ledro. selten und nicht jedes Jahr: Bocca di Trat, Gui, Casett, Tremalz di Molina 13—1800 m (Foletto 1 p. 21); Monte Baldo (Rehb. 7 XIII—XIV p. 41), an kurzberasteten Felsstellen unter der Colma di Malcesine (Lbd. 6 p. 133; b. H. 1 p. 1487). Tret de spin u. Zocchi in Buchenwäldern (Porta b. Goir. 3 XV. p. 51).

19. (668.) *O. mascula* L., *O. glaucophylla* Kern. in Oesterr. bot. Zeitschr. XIV. (1864) p. 101 (aus Ungarn). — Koch l. c. p. 595; Schulze l. c. Nr. 13.

Var. α *speciosa* (Host), *O. speciosa* Host, *O. mascula* γ (b) *speciosa* Koch, Schulze. — Koch l. c. p. 595; Schulze l. c. Nr. 13, 3. Seite.

Die vorherrschende Form.

Var. β *acutiflora* Koch, *O. mascula* β (a) *acutiflora* Koch, Schulze. — Koch l. c. p. 595; Schulze l. c. Nr. 13, 3. Seite.

Var. γ *obtusiflora* Koch, *O. mascula* α (c) *obtusiflora* Koch, Schulze. — Koch l. c. p. 595; Schulze l. c. Nr. 13, 3. Seite.

Auf Berg- und Alpenwiesen, zwischen Erica, in Gebüsch.