

T Trient: auf Sumpfwiesen hinter dem Kalisberg und bei Vigolo Vattaro (Gelmi 12 p. 234; Murr b. Schulze 4 p. 50), hier auch „zahlreich eine von Schulze mit Bestimmtheit zu *O. Traunsteineri* gezogene Form mit trübrosafarbenen Corollen, die von Exemplaren Traunsteiners aus Kitzbühel durch kürzere, stumpfere Blätter, die reichblütigere, verlängerte Traube u. s. w. beträchtlich abweicht, dagegen nach meiner Erinnerung recht gut zu Exemplaren stimmt, die schon vor etlichen Jahren von v. Benz in Kärnten gesammelt und von Schulze kürzlich als *O. Traunsteineri* var. *Frisii* Klinge bestimmt wurden“ (Murr 75 p. 118).

— \times *O. incarnata* \times *Traunsteineri*.

K Die Bemerkung bei Vollmann 2 p. 266: „Zwar fand Schulze bei Kitzbühel Formen, die von dem typischen *O. Traunsteineri* weit entfernt waren und sich in manchen Merkmalen an *O. incarnata* und sogar an *O. latifolia* anlehnten“ kann sich nach Schulze 1 Nr. 20, 9. Seite und Schulze 5 p. 110 nur auf den Standort Zell am See beziehen.

26. (676.) *O. latifolia* L. — Koch l. c. p. 596; Schulze l. c. Nr. 21.

Auf feuchten Wiesen, Mooren, an quelligen Orten, in Erlenauen.

V Gemein bis in die Voralpenregion: Hochkrumbach 1650 m, Zürs 1700 m (S.).

L Ebenso.

O Trams bei Landeck (S. Hb. F.), Fließ (Hellw.), Obladis (Mik 3 p. 75); Nauders (Tpp. b. H. 1 p. 837); Imst (Lutt. *ibid.*); Rofen im Oetztal noch bei 2020 m (K. Hb.).

I Gemein; doch fehlen Notizen von den Scharnitzertälern außer Leutasch und Seefeld, vom hinteren Sellrain und Stubai hinter Neustift, sowie von den obersten Seitentälern am Brenner; am Patscherkofel und in Navis bis 1740 m (K. 86).

U Achenal (K. 86; S.); Mündung des Zillertals (S.), Rattenberg (Längst b. H. 1 p. 1487); Kufstein (Hofer 1 p. 36; C. J. Mayer).

K Kitzbühel, gemein (Ung. 8 p. 288; Trst. b. H. 1 p. 837).

M Reschen (Tpp. 1); Langtaufers; Matschertal; Stilsertal, Rabland (Tpp. b. H. 1 p. 837); Schlanders (Kuhn).

E Brenner (K. Hb.; Peyr. b. DT. 9 p. 76); Brixen: oberhalb Mellaun (Bachl. 2 p. 16).

P Samböck und Spitzhörndl bei Bruneck (Schönach); Rittwiesen bei St. Vigil (Zschacke 1 p. 23); Welsberg (Hell b. H. 1 p. 837), Prags (Sinner Hb. F.; H. 20); Höhlenstein-Ampezzanertal an mehreren Orten bis 2200 m (Hut. 6 p. 49).

D Bergeralpe, ca. 2100 m (Keil 1 p. 12. 40); Rottenkogel (Mayr 1 p. 177), Kals, am Aufstiege zum Matreier Törl (Pfaff), Glocknergruppe (Hinterh. & Hut. 1 p. 561); Bad Innichen (Diétr.), Sexten (Buchner); Lienz (Rschf. 3; Scheitz b. H. 1 p. 837), Kreuzkofelgruppe (Keil 8 p. 157, 158), Lavant (F. Saut. 5 p. 355).

N Mendel (S.).

B Seiseralpe (Fech. b. Ambr. 4 I. p. 695; VL. Hb. F.); Welschnoven (Fech. l. c.), Costalunga (Zschacke 2 p. 124).

F Pozza; Cavalese, Bellamonte; Caoria (Fech. b. Ambr. 4 I. p. 695).