

Var. *specularia* Rchb., Icon. XIII.—XIV. (1851) p. 90.

**T** Vigolo Vattaro, wenigstens in sehr nahekommender Ausbildung (Murr 104 p. 144, fide Fleischmann).

× 4. (683.) *O. obscura* G. Beck in Oesterr. bot. Zeitschr. XXIX. (1879) p. 353, *O. fuciflora* × *aranifera*? — Schulze l. c. Nr. 28, 3. Seite.

**T** Bei Vigolo Vattaro (Murr 75 p. 116 und in litt.; b. Schulze 4 p. 57 irrig mit dem Standorte: Nago).

× 5. (684.) *O. hybrida* Pokorny in Oesterr. bot. Wochenbl. I. (1851) p. 167, *O. aranifera* × *myodes*. — Schulze l. c. Nr. 28, 4. Seite.

**T** Trient: bei Vigolo Vattaro drei Exemplare (Gelmi 15 p. 75; b. Schulze 4 p. 64).

× 6. (685.) *O. araniferiformis* nob., *O. super-aranifera* × *Bertolonii*.

**R** Bei Nago—Torbole ein kleinblütiges, der *O. aranifera* schon stark genähertes Exemplar, dessen untere Blüte auf hellbraunem Grunde die rundliche durchlochte Bertolonii-Makel zeigt, während die obere Blüte die umgekehrt hufeisenförmige Gelmi-Makel aufweist (Murr 104 p. 144 und in litt. 1905).

× 7. (686.) *O. Gelmii* Murr in Deutsche bot. Monatschr. XVI. (1898) p. 218, *O. aranifera* × *Bertolonii*.

**T** Bei Vigolo Vattaro im Mai 1898 von Gelmi entdeckt (Gelmi 15 p. 75; b. Murr 54 p. 218; b. Schulze 4 p. 62), bei San Rocco (Murr 66 p. 195; b. Schulze 4 p. 63).

**R** Zwischen Nago und Torbole (Murr 66 p. 195; b. Schulze 4 p. 62).

× 8. (687.) *O. pseudo-Bertolonii* Murr in Deutsche bot. Monatschr. XVI. (1898) p. 218, *O. sub-aranifera* × *Bertolonii*.

**T** Vigolo Vattaro (Gelmi 15 p. 75; b. Murr 54 p. 218), am Doss San Rocco (Murr 66 p. 195; b. Schulze 4 p. 63).

**R** Zwischen Nago und Torbole, zahlreicher als *O. Gelmii* (Murr in litt.).

× 9. (688.) *O. disjecta* Murr in Deutsch. bot. Monatschr. XIX. (1901) p. 114, *O. aranifera* × *Bertolonii*.

**R** Bei Nago (Murr 75 p. 114; b. Schulze 4 p. 63).

„Neben diesen zweifellosen Bastarden fand Murr auch Formen, die nur in der Lippenzeichnung von *O. Bertolonii* etwas abweichend waren. Ob diese sämtlich, wie derselbe überzeugt ist, als Rückschlagsformen, resp. Rückkreuzungen des Bastardes mit *O. Bertolonii* aufzufassen sind, wage ich nicht zu entscheiden. Unmöglich ist es nicht“ (Schulze 4 p. 63). Vergl. *O. Bertolonii*.

Bei einer anderen, besonders prächtigen, intermediären Kreuzung erscheint die perforierte Bertolonii-Makel mit derjenigen von *O. Gelmii* in reicher Ausschmückung combinirt“ (Murr 104 p. 144).