

theilte mir brieflich (3. Juli 1892) mit, sie könne auch eine *Ophrys apifera* × *Epipactis rubra* (?) sein.“ (Schulze 1 Nr. 31, 6. Seite). „Ob nicht fixierte Deformation von *O. apifera*? schwerlich Hybride mit einer *Serapias* oder *Cephalanthera*“ (Murr 81 p. 122). Nach Schulze 5 p. 116 identisch mit *O. purpurea* Tausch in Flora XIV. (1831) p. 222, *O. apifera* var. *purpurata* Rehb., Icon. XIII.—XIV. (1851) p. 97.

#### 141. *Serapias* L., Schwertwurz.

— *S. lingua* L. — Koch l. c. p. 601; Schulze l. c. Nr. 34.

**R** Monte Baldo (A. Massalongo in Hb. Sacc. nach Goir. 3 XV. p. 30) — wohl extra fines.

1. (692.) *S. longipetala* (Tenore) Pollini, Fl. veron. III. (1824) p. 30, Rehb., Fl. exc. p. 130, Kern., Schedae ad fl. austro-hung. V. (1888) p. 82, *Helleborine longipetala* Tenore, Fl. neap. prodr. (1811) p. 53, *H. pseudocordigera* Sebastiani, Rom. pl. fasc. I. (1813) p. 14, *Serapias pseudocordigera* Moricand, Fl. ven. (1820) p. 374, Hsm., *S. hirsuta* Lap., Abr. fl. Pyrén. (1813) p. 551, Schulze, siehe Nyman Consp. p. 689, *S. cordigera* Marshall-Bieb. (1808), Koch (1837), Fechnon L., *S. Lingua* Bertol., Per., Ambr. non L. — Koch l. c. p. 601; Schulze l. c. Nr. 36.

Auf feuchten Wiesen.

**G** Bei Turano im Val Vestino (Fech. b. Ambr. 4 I. p. 712).

**T** Bei Vigolo Vattaro in Menge (C. & A. Per. 4 p. 459 als *S. Lingua* neben *S. pseudocordigera*): siehe H. 1 p. 1202; Gelmi 3 p. 34; 5 p. 186; Per. b. Bertol. 2 IX. p. 602; b. H. 1 p. 846, Hb. F. etc.); Valsugana: Madonna d'Onéa bei Borgo (Fech. b. Koch 17 p. 127), Telve (Fech. b. H. 1 p. 846), Borgo (Ambr. b. H. 1 p. 846, Hb. F.), auf Torfboden im Valle d'Onéa und oberhalb Telve (Ambr. b. Bertol. 2 IX. p. 602), zwischen Telve und Pontarso, Val Onéa und Savaro (Fech. b. Koch 17 p. 127 als *S. oxyglottis* Willd.?: b. Rehb. 7 XIII.—XIV. p. 12; Ambr. 3 p. 382; 4 I. p. 712).

**R** Rovereto: bei Castellano auf Wiesen über der Etsch (Crist. b. H. 1 p. 846, Hb. F.; Fech. b. Rehb. 7 XIII.—XIV. p. 12; Ambr. 4 I. p. 712; Sard. Hb.), Dajano (G. Cob. 1 p. 65); Gardasee „ad confines“ (Porta b. K. 78<sup>a</sup> Nr. 1848, 78<sup>b</sup> V. p. 82).

Var. *refracta* Murr in Deutsch. bot. Monatschr. XIX. (1901) p. 117.

**T** Vigolo Vattaro, vereinzelt an mehreren Punkten (Murr 75 p. 117; b. Schulze 4 p. 66).

× 2. (693.) *S. Garbariorum* Murr in Deutsch. bot. Monatschr. XIX. (1901) p. 117 u. b. Schulze in Mitth. thür. bot. Ver. Neue Folge XVII. (1902) p. 40, *Serapias longipetala* × *Orchis picta* (weißlich-rosafarbene Varietät).

**T** Bei Vigolo Vattaro zwischen den Stammarten (Murr 75 p. 116—117; b. Schulze 4 p. 40).

#### *Aceras* R. Br., Ohnhorn.

— *A. anthropophora* (L.) R. Br., *Ophrys anthropophora* L. — Koch l. c. p. 600; Schulze l. c. Nr. 37.

„Südtirol“ (Kittel 1 I. Aufl. Nr. 140; in der 3. Aufl. nicht mehr).