

142. *Himantoglossum* Spreng., Riemenzunge.

1. (694.) *H. hircinum* (L.) Spreng., *Satyrium hircinum* L. — Koch l. c. p. 598; Schulze l. c. Nr. 38.

In Laubgebüschchen.

Tirol (Laicharding 1 II. p. 489).

**N** Nonsberg (Lbd. 14 p. 312), daselbst nicht weit vom Eingange (H. 20).

**B** Tramin (Morandell b. H. 20), im Altenburger Walde (Baron Biegeleben), am Wege von Tramin nach Graun (Hepp.). Die Angaben: Schlern (Spieker 1 p. 375) und Seiseralpe (Möller 1 p. 398) sind sicher unrichtig.

**G** Stenico: bei Seo 850 m und unter dem Castell (Loss 1 Nr. 129, Hb. F.); Praso nächst Daone, ca. 800 m (Porta b. H. 20; b. Gelmi 10 p. 159).

**T** Trient: Piazzina (Gelmi 10 p. 159; Pfaff), Muralta (Gelmi 3 p. 37).

**R** Rovereto (Zimm. Hb. F.), Madonna del Monte (G. Cob. 1 p. 65); ?Castione bei Brentonico (Poll. 1 p. 110; 3 III. p. 16 nicht mehr). Vergl. auch p. 507 *Orchis simia*.

143. *Anacamptis* Rich., Hundswurz.

1. (695.) *A. pyramidalis* (L.) Rich., *Orchis pyramidalis* L. — Koch l. c. p. 597; Schulze l. c. Nr. 39.

Auf sonnigen Hügeln, Berg- und Waldwiesen, an grasigen Plätzen zwischen Laubgebüschchen.

Tirol (Laichard. 1 II. [1791] p. 479).

?**V** Unweit Feldkirch gegen das Liechtenstein'sche (Rehst. b. H. 1 p. 1487, ohne jede spätere Bestätigung).

[**U** Zillertal: Waxegger Bergmähder (Moll 1 I. p. 84). Ist sicher *Gymnadenia conopsea*.]

**B** Auf den Wiesen ober Altenburg bei Kaltern und am Söllerberg, sonnige Triften bei Söll (Morandell b. H. 20); am Geierberg bei Salurn (H. 1 p. 838), worauf sich zweifellos das „Bozen“ bei Ambr. 4 I. p. 697 bezieht.

[**F** Die Angaben von Primör: Rollepaß 15—1700 m, Val Pradidali 1350 m, Sasso della Padella 1170—1600 m bei Paol. 1 p. 18, 14, 10, 11; 2 p. 132 gehören sicher zu *Gymnadenia conopsea*, welche in dieser Arbeit nicht erwähnt ist.]

**G** Sorano bei Tione (Boni b. H. 1 p. 838); Stenico (Loss Hb. F.; S. 3<sup>f</sup> p. 356); Cima del Frate (Gunn 1 p. 106); Darzo (Fech. b. Ambr. 4 I. p. 697); Uebergang von Bondone nach Val Vestino (Hut. 3 p. 139), Val d'Ampola, Val Vestino (Lbd. 13 p. 148, 136).

**T** Terlago (Gelmi 3 p. 34); Castell Toblino (Lbd. b. H. 1 p. 1487); Trient: oberhalb Vela (Fech. b. Ambr. 4 I. p. 697), hier auch reinweiß (Gelmi b. Murr 65 p. 117). Doss Trento (Hfl. b. H. 1 p. 838; Lbd. 6 p. 130), Kalisberg (VL. Hb. F.).

**R** Val di Ledro (Lbd. b. H. 1 p. 1487 etc.); Bolognana (Diettr.), Ponale bei Riva (Fech. b. Ambr. 3 p. 381; 4 I. p. 697; K. 86), Torhole bis 60 m herab (C. J. Mayer); häufig um Rovereto (Crist. b. H. 1 p. 838; Fech. b. Ambr. 3 p. 381; 4 I. p. 697; b. Bertol. 2 IX. p. 520; Lbd. b. H. 1 p. 1487; Hepp. Hb. F.; G. Cob. 1 p. 66); Brentonico (Zimm. Hb. F.); Ala (Lbd. b. H. 1 p. 1487).