

Var. *oxyglossa* G. Beck in Oesterr. bot. Zeitschr. XXIX. (1879) p. 390. — Schulze l. c. Nr. 47, 2. Seite.

T Eine annähernde Form am Kalisberg gegen Monte Vaccino — nicht in Vigolo Vattaro (Murr 75 p. 118; b. Schulze 4 p. 69 und in litt.).

Var. *Idae* Goir. in Nuovo Giorn. bot. ital. XV. (1883) p. 26. „Planta pumila, cum spica 10—12 cm longa: spica laxa, pauciflora: bracteis flores aequantibus vel superantibus: foliis angustissimis“.

N Auf dem Monte Laures und Macajon im Nonsberg 15—1800 m am 10. August 1872 entdeckt (Goir. 3 XV. p. 27).

9. (707.) *G. conopea* (L.) R. Br., *Orchis conopsea* L. — Koch l. c. p. 597; Schulze l. c. Nr. 48.

Auf Wiesen, besonders solchen ohne Düngung, Berg- und Waldwiesen, Heideflächen, im ganzen Gebiete von den Niederungen der Haupttäler bis in die Alpenregion häufig, vorwiegend über kalkhaltigen Bodenarten.

Tiefstes Vorkommen:

V Allgemein bis zur Ebene des Rhein- und Illtales, 400 m herab (Kemp 1 p. 120; Schönach; Rich. 2 p. 74).

I Um Innsbruck: Spitzbühel 700 m (Hfl. 51; K. 86), Völs 590 m, Figgen in der Talebene, 580 m (K. 86; Hfl. 51), Gluirsch ca. 700 m (Hfl. b. H. 1 p. 839), Gärberbach an der Sill, ca. 700 m (S.); Tratzberg 610 m (Huber 1 p. 69).

U Kufstein: Kienberg, ca. 700 m, Duxerköpfl, ca. 700 m (Gschwentn. 2 p. 80).

M In den Etschmösern zwischen Nals und Vilpian 250 m (Lad.).

E Brixen: beim Höllerhofe und bei Plabach, ca. 600 m (Bachl. 1 p. 75).

B Bozen: sehr selten im Gebüsche vor Runkelstein 300 m (H. 1 p. 839).

G Tione, ca. 600 m (Boni b. H. 1 p. 839; S.); Stenico 600 m (S.).

R Schlucht bei Varignano nächst Arco 100 m (Diettr.); Rovereto [ca. 200 m]: „nei prati e nei pascoli di collina e nelle radure dei boschi. Commune“ (G. Cob. 1 p. 65); Ala 250 m (K. 86).

Höchstes Vorkommen:

I Tarntalerköpfe 2370 m (K. 86).

F Schwarzhorn bei Cavalese 2350 m (S.).

Für das Gebiet zuerst von Mattioli (1 ed. 1565 p. 885) angegeben: „Palma Christi major, in Ananiae vallis montibus“.

Var. *ornithis* (Jacq.) G. Beck, Fl. v. Niederösterreich. I. (1890) p. 209, *Orchis ornithis* Jacq., Fl. austr. icon. II. (1774) tab. 38. — Schulze l. c. Nr. 48, 2. Seite.

I Zirler Mähder (Handel 2 p. 28).

Var. *crenulata* G. Beck, Fl. v. Niederösterreich. I. (1890) p. 210. — Schulze l. c. Nr. 48, 2. Seite.

B Rittnerhorn bei 1500 m (Malý 1^a p. 130, 1^b p. 529).