

(Schunck 1 p. 335); Fleims (Fech. 5 p. 114), Campagnazza oberhalb San Pellegrino (Gelmi l. c), Paneveggio (Eichenf. 3 p. 34).

G Alpe Cleoba im Val Daone (Porta b. K. 21 p. 219).

T Malga Zambana di sotto oberhalb Fai (Gelmi 10 p. 159), Canfedin am Monte Gazza, Rosta am Monte Bondone (Gelmi 15 p. 75), Monte Vasone (Gelmi 12 p. 234).

R Dossi bei Serrada (Gelmi 12 p. 234); Colsanto (Hut. 4 p. 23 u. b. K. 21 p. 219).

× 11. (709.) **G. megastachya** (Kern.) Wetst. in Ber. deutsch. bot. Ges. VII. (1889) p. 317, Nigritella megastachya Kern. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XV. (1865) p. 223, G. super-conopea × nigra vel G. conopea × suaveolens. — Schulze l. c. Nr. 48, 5. Seite.

I Leutascher Mähder (Grembl. Hb.); Zirler Bergmähder, in einem einzigen Exemplar 1740 m (K. 21 p. 223 u. Hb.); Voldertal (Grembl.); Wipptal (Kolb 1 p. 190).

P Ampezzo: bei den Cinque torri am Nuvolau (Ronniger, det. Fleischmann).

D Kals (Hut. b. H. 20).

× 12. (710.) **G. brachystachya** (Kern.) Wetst. in Ber. deutsch. bot. Ges. VII. (1889) p. 317, Nigritella brachystachya Kern. in Verh. zool. bot. Ges. Wien XV. (1865) p. 224, G. sub-conopea × nigra vel G. nigra × suaveolens. — Schulze l. c. Nr. 48, 6. Seite.

I Unter Pflanzen eines auf dem Markte in Innsbruck gekauften, angeblich von Sellrain stammenden Straußes (Fleischmann b. Schulze 4 p. 72).

U Am Pfanserjoch im Achtentale bei 1580 m ein einziges Exemplar (K. 21 p. 224).

D Kals (Hut. b. H. 20).

× 13. (711.) **G. intermedia** Peterm., Flora des Bienitz (1841) p. 30, nach Focke, Pflanzenmischl. (1881) p. 378: „Kern.? (non Peterm.?)“, ? Orchis erubescens Zucc. in Sylloge ratisbon. II. (1824) p. 10, siehe Schulze, Orchidac. Nr. 48, 7. Seite, ? Gymnadenia suaveolens Rehb., Fl. exc. p. 121 (1830) non Vill., G. conopea × odoratissima. — Schulze l. c. Nr. 48, 7. Seite.

I ? Am Solstein (Andr. Saut. 2 Nr. 140; b. Saut. 3 [1829] p. 131 u. b. Rehb. 4 p. 121 als G. suaveolens; vergl. das Referat in Flora XVI. (1833) p. 238: „was als Gymnadenia suaveolens vorkommt, ist Orchis erubescens Zucc.“; Andr. Saut. 5 p. 759 als O. erubescens); Innsbruck: auf den Wiesen nächst Völs 584 (K. 21 p. 215; S.), am Spitzbühel (K. Hb.); Gschnitztal: am Kalbenjoch (K. 58 p. 253, Hb.), am Bläser (F. Saut.) und im Padaster (Wettst. [1899]).

U Am Gaisalpl im Achtentale 950 m (K. 21 p. 215, Hb.).

[**K** Siehe G. suaveolens.]

D Windischmatrei (Ausserd. b. Schulze 4 p. 72).

T Trient: hinter dem Kalisberg (Gelmi 15 p. 75), ebenda ein Exemplar bei 600 m und ein anderes habituell der G. odoratissima nahestehendes Stück in Vigolo Vattaro (Murr 75 p. 116—117; b. Schulze 4 p. 72; 5 p. 120).