

T Monte Gazza (Merlo b. H. 1 p. 852); Molveno (Sard. Hb.); Trient: Bondone (Gelmi 1 p. 72), Margone (Sard. Hb.), Kalisberg (C. & A. Per. 4 p. 459); Valsugana: Olle, Val di Sella, Monte Lefre (Ambr. b. H. 1 p. 852; Ambr. 4 I. p. 731).

R Rovereto: im Walde der Franziskaner von Drio Pozzo, im Walde des Herrn v. Tacchi bei Lizzanella (G. Cob. 1 p. 66), bei Marco (Ambr. 4 I. p. 731); Pieve di Vallarsa (Hut. b. H. 20); am tirolischen Monte Baldo: um den Pian della Cenere (Poll. 1 p. 113; 3 III. p. 37), im Val d'Artalone (Pona 1 p. 238 als Satirio abortivo del Lobelio; vergl. Poll. 1. c.; Goir. 3 XV. p. 18).

156. *Goodyera* R. Br., *Goodyera*, Netzblatt.

1. (734) **G. repens** (L.) R. Br., *Satyrium repens* L. — Koch l. c. p. 603; Schulze l. c. Nr. 66.

Im Moose lichter Nadelwälder, besonders unter Föhren; auch auf Lärchwiesen; bis in die Voralpenregion.

Tirol (Laichard. 1 II. [1791] p. 493).

V Möggers (Milz b. Rich. 2 p. 75); Dornbirn (Bruhin *ibid.*), ober Laterns (Rehst. b. H. 1 p. 1489); um Feldkirch (Kemp 1 p. 121; Aich. 2 p. 290; Hasler 1); im Walgau häufig (Rich. 2 p. 75); zwischen Brand und dem Lünzersee (Rick, Winder b. Rich. 3 p. 133).

L Salober bei Vils (Fröl. b. Kögl 2 p. 240); Mühlbachtal bei Holzgau (Zimm.), Lechauen bei Elbigenalp (B. Moll Hb. F.), Bach- und Rauchwand (S.).

O Zamerloch (Hellw.); Mils bei Imst (Kot. Hb.); Obsteig (Zimm.); nicht selten im Oetztale (Ebner b. H. 20), am Schrankogel bei Längenfeld (Harg. 1 p. 439).

I Leutasch (Hellw.); Hinterautal (Ebner Hb. F.); häufig bei Kerschbuch und Kranebitten (Schm. b. H. 1 p. 852; J. Zimm. Hb. F.; Hallier 1 p. 198; K. Hb.; Murr 8 p. 171; Peyr. b. DT. 9 p. 77 etc.); Afling (Schönach in Hb. K.), Völs (Handel 2 p. 29), Plumesköpfl (Peyr. l. c.), Berg Isel (Murr; S.), Ahrnberg (Kot. Hb.), zwischen Sistrans und Judenstein (DT.); St. Michael im Gnadenwald (Grembl. Hb.; Murr); Kogelmoos bei Schwaz (Schm. b. H. 1 p. 852; Hb. Univ.); Stuhai; an der rechten Talseite von Mieders bis Neder (Roth Hb. F.; S. 4 p. 380); Gschnitztal: an der Hohen Burg und vom Muliboden bis St. Magdalena 13–1500 m (K. 86; S.).

U Achenal an mehreren Orten (Pichler b. H. 20; K. 86; Rottenb. 1 p. 14; S.); Kasbachtal (Rottenb. l. c.); Rottenburg (DT.); Sonnwendjoch bis 1680 m, Brandenberg, Mariathal (Längst b. H. 1 p. 1489; Pechlaner); Kundl (Kot. Hb.); um Kufstein (K. Hb.); Gschwentn. 1 p. 86; 2 p. 80; Hofer 1 p. 36; Eigner).

K Kitzbühel: Schlucht zwischen Gschöb und Blaufeld (Saut. 7 p. 477), Leitneralpe (Ung. 8 p. 289).

K Kreuzberg bei Lana und Gall bei Tisens (Lad. 2 p. 141 u. in litt.), zwischen Prissian und Gfrill (Lad.).

P Kolfuschg (H. 1 p. 852); Krefwasserl bei Bruneck (Schönach Hb. Gymn.); Bergfall, Hochalpe (Schönach); Prags an verschiedenen Orten (H. 1 p. 1489; 20; S.); Toblach—Puez-Alpe (Lukasch); Ampezzo vom Toblachersee bis Schluderbach (Hackel 1 p. 666; Hut. 6 p. 50; Artz 2 p. 102); Buchenstein: Soraruaz (S.), zwischen Andraz und Caprile (Crépin 2 p. 185).