

9. *Viola sepincola* Jord. 1849 = *V. Beraudii* Bor. 1857 = *Viola austriaca* A. et J. Kern. 1872 = *V. cyanea* Cel. 1872. — Allg. bot. Zeitschr. IX. Jg. 1903 p. 114—118.

Ueber die Stellung der *Viola sepincola* im System mit Bemerkungen über die bei Innsbruck und in Südtirol vorkommende Pflanze.

10. Ueber *Viola Oenipontana* Murr. D. bot. Monatsschr. (1886) p. 151. — Allg. bot. Zeitschr. IX. Jg. 1903 p. 157—160. — Ref.: Oesterr. bot. Zeitschr. LIII. Jg. 1903 p. 463.

Verfasser erklärt die *Viola oenipontana* von den Allerheiligenhöfen bei Innsbruck, welche Murr für *V. super-hirta* × *odorata* bezw. nachträglich für *V. (odorata* × *pyrenaica* [*sciaphila*]) × *hirta* hält, und welche in Becker, *Viol. exs.* als *V. hirta* × *odorata* f. *accedens* ad *V. odoratam* (*V. pseudo-sepincola* Becker) ausgegeben ist, für *V. hirta* × *pyrenaica* f. ad *pyrenaicam* *accedens*.

11. Bemerkung zu obiger Erklärung. — Allg. bot. Zeitschr. IX. Jg. 1903 p. 199.

Zu Murr Nr. 106, betreffend *Viola oenipontana*.

12. Zur Veilchenflora Tirols. — Zeitschr. Ferdinandeum Innsbruck III. Folge 48. Heft 1904 p. 323—346. — Rec.: Österr. bot. Zeitschr. LV. Jg. 1905 p. 31, Verh. zool. bot. Ges. Wien LV. Bd. 1905 p. 377—379 (von Dr. Freih. v. Handel-Mazzetti).

Bearbeitung der tirolischen *Viola*-Arten nach dem vom Verfasser im April 1904 bei Innsbruck gesammelten Material, dann nach seinem Herbar, enthaltend Beiträge von Dr. J. Murr und J. Poll, und nach der Sammlung des Ferdinandeums. Leider entbehren die Fundorte mit wenigen Ausnahmen der Quellenangaben.

13. Systematische Behandlung der *Viola arvensis* s. l. auf Grundlage unserer phylogenetischen Kenntnisse. — Mittheil. Thüring. bot. Ver. N. F. Heft XIX. 1904 p. 26—49.

p. 31: Mittelform zwischen *V. arvensis* und *V. tricolor*, Corolle den Kelch deutlich überragend, bis 25 mm breit, gelb. Luttach, leg. Treffer.

14. Die systematische Behandlung der Formenkreise der *Viola calcarata* und *lutea* (im weitesten Sinne genommen) auf Grundlage ihrer Entwicklungsgeschichte. — Beihefte zum bot. Centralbl. Bd. XVIII. 1905 p. 347—393.

Tirol p. 355: *V. calcarata* L., Obermädlejoch, Kratzer, Lüneralpe, Alma-jurjoch, Wöster, Stilsferjoch, Steinjoch, Langtaufers, Zamerjoch, Taufers, Krumbach, Elbigenalp: var. *flore flavo*: Langtaufers: p. 386: *V. Dubyan* a Burnat, Monte Baldo, Val Vestino, Val di Ledro, Monte Stino, Stenico, Tomba.

15. Berichtigungen zu den *Violae exsiccatae*, Liefg. 1—5. — Allg. bot. Zeitschr. XI. Jg. 1905 p. 27—29.

In dem hier gegebenen Verzeichnis der in Liefg. 1—V. der *Violae exsiccatae* ausgegebenen Veilchen werden die meisten Bestimmungen der Nummern aus Tirol (23, 79, 80, 81, 82, 87, 105) modifiziert.

16. Die systematische Behandlung der *Viola cenisia* (im weitesten Sinne genommen) auf Grundlage ihrer mutmaßlichen Phylogenie. — Beihefte bot. Centralbl. XX. 2. Abt. 1906 p. 108—124.

p. 116 wird auf die Unglaubwürdigkeit der Litteraturangaben für *V. cenisia* aus Tirol hingewiesen.